



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Plodovke

/ 67. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR, BUČK IN BUČ PRED PRŠICAMI

67. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR, BUČK IN BUČ PRED PRŠICAMI - 30.07.2021 13:15 - Zaključeno



Pri opazovanju kumar, bučk in buč smo v zadnjih dneh opazili pojave pršic. Beležimo tudi poškodbe povzročene od pršic tako v zavarovanih prostorih kot tudi na prostem. Poskrbimo, da redno odstranjujemo plevelne rastline, saj s tem omejujemo populacije pršic. Ob prerazmnožitvah pa priporočamo uporabo registriranih akaricidov: **Kanemite SC (manjša uporaba)**, kumare; na prostem v odmerku 1,25 L/ha, največ 1-krat v rastni sezoni in v zaščiteneh prostorih v odmerkih od 0,625 L/ha do 1,25 L/ha največ 2-krat v rastni sezoni; K = 3 dni), **Nissorun 10 WP** (kumare, dinje, lubenice, buče in druge bučnice z neužitno lupino v zaščiteneh prostorih; kumarice za vlaganje na prostem ali v zaščiteneh prostorih; vedno v odmerku 0,8 kg/ha (8 g na 10 L vode na 100m²), največ 1-krat v rastni sezoni, K = 3 dni), **Nissorun 250 SC** (kumare, bučke, buče, dinje, lubenice in druge bučnice z užitno in neužitno lupino v zaščiteneh prostorih; v odmerkih 0,16 L/ha do 0,32 L/ha, največ 1-krat v rastni sezoni, K = 3 dni), **Ortus 5 SC** (kumare, bučke; v zaščiteneh prostorih; v 0,15 % koncentraciji (15 ml na 10 L vode ob izhodiščni porabi vode 1000 L/ha, največ 1-krat v rastni sezoni, K = 7 dni), **Requiem prime** (kumare, bučke, dinje; v zaščiteneh prostorih; v odmerku 5 L/ha na višinski meter rastline; lubenice, buče (**manjša uporaba**), v zaščiteneh prostorih; v odmerku 6,5 L/ha; največ 12-krat v enem letu, K = 1 dan), **Vertimec pro** (na prostem in v zaščiteneh prostorih; dinje, lubenice, buče v 0,075 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha (7,5 ml/10 L vode); bučke, kumare in kumarice za vlaganje v najvišjem odmerku 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m²), za vse največ 2-krat v eni rastni dobi, K = 3 dni).

Vertimec pro lahko uporabimo tudi za zatiranje paradižnikove pršice (*Aculus lycopersici*).

Stransko delovanje na pršice imajo tudi fungicidi na osnovi žvepla: Cosan, Kumulus DF, Microthiol disperss, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vertipin, Vindex 80 WG.

Za dovoljene manjše uporabe FFS učinkovitost in fitotoksičnost ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva! Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa ostala opozorila navedena v navodilih za uporabo!

Datum objave obvestila: 30.07.2021 13:15

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

