

80. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI - 27.08.2021 09:57 - Zaključeno



Setev oljne ogrščice se je v severovzhodni Sloveniji pričela v tem tednu. Za zatiranje plevelov lahko uporabite herbicide pred ali po vzniku oljne ogrščice. Za dobro delovanje talnih herbicidov je pomembna dobra priprava tal, brez grud in kamenja ter talna vlaga za aktiviranje herbicidov, ki delujejo preko tal. Pridelovalci, ki ste vključeni v KOPOP in VVOI, upoštevajte seznam dovoljenih herbicidov.

HERBICIDI ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI SO:

Pripravek	Odmerek	Fenološka faza uporabe	Za zatiranje
Devrinol 45 FL (napropamid 45%)	2,5 l/ha	Pred setvijo , potrebno ga je zadelati v tla na globino 2 do 5 cm.	Enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla
Angelus, Centium 36 SC, Clomate (klomazon 36%)	0,33 l/ha 0,25 l/ha 0,33 l/ha	Pred vznikom , najpozneje tri dni po setvi oljne ogrščice.	Nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevla
Teridox 500 EC (dimetaklor 50%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	2,0 l/ha	Pred vznikom ali ob vzniku ogrščice (BBCH 00 – 09). Na isti površini se ga lahko uporablja le vsaka tri leta.	Širokolistnega in ozkolistnega plevla
Butisan 400 SC (metazaklor 40%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	2,5 l/ha	Pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice do osmih listov (BBCH 00 – 18). Plevli do tretjega lista.	Semenskega širokolistnega in ozkolistnega plevla
Butisan S (metazaklor 50%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	2,0 l/ha, lahko v deljenem odmerku	Pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice do tretjega pravega lista (BBCH 11 -13). Plevli do tretjega lista.	Semenskega širokolistnega in ozkolistnega plevla
Rapsan 500 SC (metazaklor 50%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	2,0 L/ha, lahko v deljenem odmerku	Od fenološke faze suhega semena do faze, ko hipokotil s kličnimi listi raste proti površini zemlje (BBCH 01-08), ali v fenološki fazi od razvitega prvega do tretjega pravega lista (BBCH 11-13).	za zatiranje širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevla
Fuego (metazaklor 50%)	1,5 l/ha	Pred vznikom ali takoj po vzniku oljne ogrščice plevelov in plevli do 2 listov.	Širokolistnega in ozkolistne plevle

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.			
Fuego top (kvinmerak 12,5% + metazaklor 37,5%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	2 l/ha	Pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice do največ četrtega lista.	Širokolistnega in enoletnega ozkolistnega plevela
Belkar (halauksifen-metil 1%+ pikloram 4,8%)	0,25 l/ha 0,5 l/ha, lahko tudi v deljenem odmerku 2x 0,25l/ha	Po vzniku oljne ogrščice in plevela Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko sta dva lista razvita (BBCH 12), do fenološke faze, ko so razviti štirje listi (BBCH 14); v primeru, da se ponovno pojavijo pleveli, se tretiranje ponovi po 14 dni, (2x0,25 l/ha), Ali v enkratnem odmerku 0,5 L na ha. Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko je šesti list razvit (BBCH 16), do fenološke faze, ko je osmi list razvit (BBCH 18).	enoletnega širokolistnega plevela
Korvetto (halauksifen-metil 5%+ klopirolid 12%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	1 L/ha	S sredstvom se tretira po vzniku posevka, spomladi, od fenološke faze, ko še ni stranskih poganjkov (BBCH 20), do fenološke faze, ko so cvetni brsti še vedno obdani z listi (BBCH 50).	za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela.
Cleranda (imazamoks 1,75%+ Metazaklor 37,5%) + močilo DASH 1 l/ha Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	2 l/ha	Uporablja se samo za hibride oljne ogrščice CLEARFIELD. Po vzniku od dobro razvitih kličnih listov do osmih listov oljne ogrščice, plevel do štiri liste.	širokolistnega in ozkolistnega plevela
Cleravo (imazamoks 3,5% +kvinmerak 25%) + močilo DASH 1 l/ha	1 l/ha	Uporablja se samo za hibride oljne ogrščice CLEARFIELD. Po vzniku jeseni od razgrnjenih kličnih listov do 8 listov oljne ogrščice ali spomladi po začetku rasti stebela do pojava socvetja.	širokolistnega in ozkolistnega plevela
Tanaris (dietenamid-P 33,3 % + kvinmerak 16,7 %) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	1,5 L/ha	Sredstvo se uporablja pred vznikom do fenološke faze vznika kličnega lista (BBCH 00-09) ali po vzniku od fenološke faze popolnoma razvitih kličnih listov do razvitih osem listov (BBCH 10-18).	Enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela, vzniklega iz semena
Successor 600 (petoksamid 60%) Prepovedan na VVOI in na	2 l/ha	Pred vznikom oljne ogrščice, če je dovolj talne vlažnosti oziroma po vzniku oljne ogrščice do razvojne faze 4 listov.	širokolistnega in ozkolistnega plevela

območjih NUV za vključene v KOPOP.			
Lontrel 100 (klopiralid 10%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	1-1,2 l/ha	Po vzniku oljne ogrščice, v razvojni fazi, ko je prvi list razgrnjen do pojava socvetja (BBCH 11 - 55).	Širokolistni pleveli, posebej dobro deluje na naslednje plevelne vrste: bodiče, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov .
Lontrel 72 SG (klopiralid 72%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	0,17 kg/ha	Po vzniku v razvojni fazi, ko je prvi list razvit, do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje), vendar, ko so ti še vedno zaprti (BBCH 11- 55); ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov	za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela
Clap (klopiralid 30%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	0,4 l/ha	Tretiranje se opravi od razvojne faze, ko je osem listov razvitih, do faze zelenega brsta, ko so cvetni brsti vidni od zgoraj (BBCH 18-51). Ozimno oljno ogrščico je dovoljeno tretirati le v spomladanskem času.	za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela
Major 300 SL (klopiralid 30%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	0,3 - 0,4 l/ha	Tretira se spomladi, od razvojne faze, ko je oljna ogrščica v fazi izdolževanja poganjkov, do faze, ko so prisotni cvetni brsti še obdani z listi (BBCH 30-50)	za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela
Clap forte (klopiralid 72%) Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	0,167 kg/ha	Sredstvo se uporablja spomladi, po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov. V ozimni oljni ogršici se sredstvo uporablja od razvojne faze konca razvoja stranskih poganjkov: zaznavnih devet ali več stranskih poganjkov, do faze cvetni brsti vidni od zgoraj ("zelen brst") (BBCH 29-51)	za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela
Fusilade forte (fluazifop-p-butil 15%) Fusilade max (fluazifop-p-butil 12,5%)	0,8-2 l/ha 1,6 l/ha	Po vzniku oljne ogrščice in plevelov do faze cvetenja	Enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke.
Agil 100 EC (propakvizafop 10%)	0,75 -1,5 l/ha	Po vzniku oljne ogrščice od dveh pravih listov do konca oblikovanja stranskih poganjkov in plevel od dveh listov do sredine razraščanja	Enoletnega in nekaterega večletnega ozkolistnega plevela
Frequent (fluazifop-p-butil 12,5%)	2-3 l&/ha	Po vzniku oljne ogrščice in plevelov do faze cvetenja	Enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke.
Select (kletodim 12 %)	1,0L/ha	Tretira se jeseni ali spomladi, oz. od razvojne faze dveh razvitih listov do faze začetka rasti stebela (BBCH 12-	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih

		30).	žit
Focus ultra (cikloksidim 10%) +močilo DASH	1- 4 l/ha	Po vzniku oljne ogrščice od dveh pravih listov do konca oblikovanja stranskih poganjkov in plevelov plevel od dveh listov do konca razraščanja	Enoletnega in večletnega ozkolistnega plevla.
Quick 5 EC (kvizalofop-p-etil 5%)	1-2 l/ha	Po vzniku oljne ogrščice in plevelov od 2 listov do konca razraščanja.	Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevla
Digator (kvizalofop-p-etil 10,8%)	1 l/ha	Po vzniku oljne ogrščice in plevelov od 2 listov do konca razraščanja.	Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevla
Targa super (kvizalofop-p-etil 5%)	1,2-2,5 l/ha	Po vzniku oljne ogrščice in plevelov od 2 listov do konca razraščanja.	Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevla
Wish top (kvizalofop-p-etil 12 %)	0,9 l/ha	Uporablja se v razvojni fazi od dveh do osmih listov (BBCH 12-18).	Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevla
Zetrola (propakvizafop 10%)	0,75 – 1,5 l/ha	Po vzniku od dveh pravih listov do konca razraščanja (BBCH 12-29) v času jesenskega tretiranja, ter od začetka razraščanja do 9 ali več vidno podaljšanih internodijev (BBCH 21-39) v času spomladanskega tretiranja.	Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevla

Prepovedan na najožjem VVO*- to so aktivne snovi, ki po vodovarstveni Uredbi niso dovoljene na najožjem vodovarstvenem območju (VVOI).

Prepovedan na območju NUV*(KOPOP) - prepoved velja za kmetovalce, ki so vključeni v program KOPOP v operacijo Poljedelstvo in zelenjadarstvo in operacijo Vodni viri na prispevnih območjih vodnih teles površinskih in podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda, kratica NUV.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 27.08.2021 09:57

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

