



110. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 01.09.2021 11:21 - Zaključeno



Oljčna muha

V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu vzorčenih plodov na posameznih lokacijah opažamo povečano poškodovanost plodov in sicer z jajčeci in ličinkami L1 stadija. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

V nekaterih nasadih, kjer spremljamo ulove oljčne muhe je sušenje in odpadanje oljk tako izrazito, da pregled poškodovanosti plodov ne bo mogoč. Zaradi omenjenega bodo vrednosti poškodb oljk podane samo za manj prizadete oljčnike.

Zaradi manjšega števila plodov v večini oljčnikov so ti kljub nizki populaciji oljčne muhe bolj izpostavljeni napadu škodljivke. Oljkarjem priporočamo, da v oljčnikih redno spremljajo napadenost plodov in po potrebi ukrepajo.

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden), **priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo** po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek **GF 120** v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo **Naturalis** na osnovi entomopatogene glive *Bauveria bassiana* v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina **Decis 2,5 EC** v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta **Imidan 50 WG** v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 2x letno.

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega **prag škodljivosti** (več kot 10% plodov z odloženimi jajčeci in ličinkami prvega razvojnega stadija) priporočamo **kurativno škropljenje** po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Ukrepanje lahko s sistemskim sredstvom na osnovi acetamiprida **Mospilan 20SG** v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Omenjen pripravek deluje tudi proti **marmorirani smrdljivki**, ki jo opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

Marmorirana smrdljivka

V oljčnikih na območju Slovenske Istre, Vipavske doline in Goriških Brd se povečuje tudi populacija **marmorirane smrdljivke**. Trenutno v nasadih opažamo izglede ličinke drugega rodu in odrasle stenice, ki se dodatno prehranjujejo na oljkah, kjer pa poleg posamičnih vbodov ne povzročajo večje gospodarske škode. Stransko delovanje na stenice marmorirane smrdljivke imajo tudi pripravki na osnovi fosmeta (Imidan 50 WG) ali deltametrina (Decis 2,5 EC), ki pa so registrirani za zatiranje oljčne muhe. Če bo v posameznih oljčnikih prišlo do večjega pojava stenice lahko za njeno zatiranje uporabimo tudi registrirano sredstvo na osnovi acetamiprida - **Mospilan 20SG**. Pripravek, ki je hkrati registriran tudi za zatiranje oljčne muhe uporabimo v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno.

Pavje oko in oljkova siva pegavost

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost s **pavjim očesom** in **oljkovo sivo pegavostjo** priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra.

Uporabimo lahko pripravek **Cuprblau Z 35 WP** v odmerku 2 kg/ha (0,3% priprava pri porabi 660 l vode/ha) ali **Cuprblau Z 35 WG** v odmerku 1,6 - 2 kg/ha ali **Nordox 75 WG** v odmerku 1,25 kg/ha.

Bakrovi pripravki imajo poleg **fungicidnega tudi odvrčalni učinek na oljčno muho**. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Poleg bakrovih pripravkov lahko v sklopu ekološke pridelave oljk proti pavjemu očesu uporabimo tudi biološka pripravka na osnovi bakterije *Bacillus amyloliquefaciens* **Serenade ASO** v odmerku 8 l/ha ali **Taegro** v odmerku 0,185 do 0,37 kg/ha.

Od organskih fungicidov lahko proti **pavjemu očesu** uporabimo **Score 250 EC** v odmerku 0,5 l/ha.

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK	KARENCA
- bakrov oksiklorid	Cuprblau-Z 35 WG	1.6-2 kg/ha	14 dni
- bakrov oksiklorid	Cuprblau-Z 35 WP	2 kg/ha	14 dni
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha	14 dni
- <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Serenade ASO	8 l/ha	Ni potrebna
- <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Taegro	0,185-0,37 kg/ha	1 dan
- difenkonazol	Score 250 EC	0,5 l/ha	30 dni

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Bodite pozorni na karenci pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 01.09.2021 11:21

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

