



115. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 22.09.2021 13:19 - Zaključeno



Oljčna muha

V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah po predvidevanjih še vedno opazamo povečano prisotnost **oljčne muhe**. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Trenutno oljkarjem na območjih kjer se muha številčneje pojavlja (3 oziroma več muh/vabo na teden), **priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo** po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek **GF 120** v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo **Naturalis** na osnovi entomopatogene glive *Beauveria bassiana* v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina **Decis 2,5 EC** v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo	Karenca dni
GF 120	7
Naturalis	ni potrebna
Decis 2,5 EC,	7

Zaradi manjšega števila plodov v večini oljčnikov so ti bolj izpostavljeni napadu škodljivke. Oljkarjem priporočamo, da v oljčnikih redno spremljajo prisotnost škodljivke in napadenost plodov, ter po potrebi ukrepajo.

Bliža se čas obiranja oljk zato pozor na karencu uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si

Marmorirana smrdljivka

Na vabah z agregacijskimi feromoni opazamo povečan ulov stenic **marmorirane smrdljivke**. Kljub številčnemu ulovu večje škode na plodovih oljk ne opazamo. Stransko delovanje na stenice marmorirane smrdljivke ima tudi pripravek na osnovi deltametrina (Decis 2,5 EC), ki je registriran za zatiranje oljčne muhe in ima kratko karencu. Z omenjenim sredstvom je v oljčnikih dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pavje oko

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost s **pavjim očesom** po zadnjih obilnejših padavinah priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra.

Uporabimo lahko pripravek **Cuprablau Z 35 WP** v odmerku 2 kg/ha (0,3% priprava pri porabi 660 l vode/ha) ali **Cuprablau Z 35 WG** v odmerku 1,6 - 2 kg/ha ali **Nordox 75 WG** v odmerku 1,25 kg/ha.

Bakrovi pripravki imajo poleg **fungicidnega tudi odvrčalni učinek na oljčno muho**. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Poleg bakrovih pripravkov lahko v sklopu ekološke pridelave oljk proti pavjemu očesu uporabimo tudi biološka pripravka na osnovi bakterije *Bacillus amyloliquefaciens* **Serenade ASO** v odmerku 8 l/ha ali **Taegro** v odmerku 0,185 do 0,37 kg/ha.

Glavni bolezenski znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih. Na bolezen sta posebno občutljivi sorti Istrska belica in Oblica.

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK	KARENCA
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WG	1.6-2 kg/ha	14 dni
	Cuprablau-Z 35 WP	2 kg/ha	14 dni
- bakrov oksiklorid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha	14 dni
- bakrov oksid	Serenade ASO	8 l/ha	Ni potrebna
- Bacillus amyloliquefaciens	Taegro	0,185-0,37 kg/ha	1 dan
- Bacillus amyloliquefaciens			

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 22.09.2021 13:19
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60
[Seznam registriranih FFS](#)

