

2. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 03.02.2022 12:26 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)

Na izpostavljenih legah so brsti zgodnjih sort marelic že napeti. Pridelovalcem svetujemo, da sorte, ki so v fenološki fazi B-C po Baggioliniju ali BBCH51-53 škropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev** in drugim boleznim, ki prezimijo na lesu.

Za škropljenje nasadov uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2-3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 03.02.2022 12:26

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

