



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Oljna ogrščica

/ 1. OBVESTILO O SPREMLJANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI

1. OBVESTILO O SPREMLJANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI - 11.02.2022 09:24 - Zaključeno



Zaradi visokih dnevnih temperatur nad 10°C, suhega in toplega vremena, pričakujemo nalet škodljivcev oljne ogrščice kot sta **stebelni kapusov kljunotaj** (*Ceutorhynchus quadrienz*) in **ogrščični repični kljunotaj** (*Ceutorhynchus napi*).

Priporočamo, da na svojih posevkih ogrščice spremljate nalet obeh vrst kljunotajev s pomočjo rumenih posod v katere se nalije voda in se pregleduje na tri dni. V vodo se doda nekaj kapljic detergenta za pranje porode, s tem se zmanjša površinska napetost. Rumene porode pokrite z zaščitno mrežo (priložena v kompletu), zato, da se prepreči nalet in utopitev čebel in drugih insektov.

Rumene posode lahko naročite: Temmen GmbH, Florsheimer Str. 30, 65795 Hattersheim, infoemmen.de, Nemčija. Lahko se nastavijo tudi rumene lepljive plošče, ali pa se kontrolira nalet tako, da se naključno pregledajo posamezne rastline.

Škodo povzročajo ličinke obeh vrst kljunotajev, zavrtajo se v steblo, s tem se zmanjša prevodnost vode in hranilnih snovi po rastlini, posledično se zmanjša pridelek. Kljunotaji se začnejo pojavljati zelo zgodaj spomladi, ko se dnevne temperature dvignejo nad 10°C, temperature tal na 2 cm pa nad 6°C.

PRAGOVI ŠKODLJIVOSTI:

- Ogrščični (repični) kljunotaj (*Ceutorhynchus napi*): **5 hroščev/posodo na 3 dni**,
- Stebelni kapusov kljunotaj (*Ceutorhynchus quadrienz*): **15 hroščev/posodo/ 3 dni**

Kljunotaje je potrebno zatreti v nekaj dneh, ko je presežen prag škodljivosti.

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh.

Javna služba za varstvo rastlin

Datum objave obvestila: 11.02.2022 09:24

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

