

5. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN - 11.02.2022 09:35 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)

Na izpostavljenih legah so brsti marelic že napeti. Če nasadov, ki so v fenološki fazi B-C po Baggoliniju ali BBCH51-53 še niste škropili proti **listni luknjičavosti koščičarjev** svetujemo, da to opravite pred napovedanimi padavinami.

Za škropljenje nasadov uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2-3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Breskova kodravost (*Taphrina deformans*) in listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)

V nasadih zgodnjih sort breskev in nektarin, ki rastejo na južnih legah so brsti že nabrekli. Če nasadov še niste škropili proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev**, predlagamo, da to opravite pred napovedanimi padavinami. Za škropljenje uporabite **bakrove pripravke**. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Registrirana sredstva na osnovi **bakra**:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 11.02.2022 09:35

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

