

Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Koščičarji
/ 1. VARSTVO BRESKEV, NEKTARIN IN MARELIC

1. VARSTVO BRESKEV, NEKTARIN IN MARELIC - 22.02.2022 12:23 - Zaključeno



Na območju Celjske in Koroške regije so breskve in nektarine na toplejših legah vstopile v fenološko fazo nabrekanja brstov (listni brsti BBCH 01-03, cvetni brsti: BBCH 00-51) in hkrati tudi v občutljivo razvojno fazo za okužbe z **breskovo kodravostjo**. Poleg razvojne faze morata biti za uspešno okužbo izpolnjeni še naslednja pogoja: **temperatur zraka nad 8 °C in dovolj padavin**.

Na lokacija, kjer so breskve in nektarine že dosegle fenološko fazo nabrekanja brstov (listni brsti BBCH 03) **opravite tik pred napovednimi padavinami prvo škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravki na osnovi bakra**, saj strategija obvladovanja te bolezni temelji na preventivnem pristopu. V primeru nočnih temperaturah pod lediščem, s škropljenjem počakajte in ga opravite po otoplitvi vremena. Škropljenje z bakrovimi pripravki lahko pri temperaturah pod 0 °C povzroča ožige.

Prvo škropljenje **breskev in nektarin** proti **breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev** opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

Tudi marelice so v fazi nabrekanja brstov (BBCH 01 – 03). Zato prvo škropljenje **marelic** proti **listni luknjičavosti koščičarjev** opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2 – 3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Datum objave obvestila: 22.02.2022 12:23

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

