

9. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 24.02.2022 13:54 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Zgodnje sorte marelic na izpostavljenih legah prehajajo v fazo cvetenja (fenofaza BBCH 59 - 60 ali E po Baggioliniju). Ko bo odprtih 10 % cvetov je priporočljivo opraviti škropljenje proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite naslednje pripravke.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
AMYLO-X	1,5 do 2,5 kg/ha
CHORUS 50 WG	0,5 kg/ha
DUAXO KONCENTRAT	1,1 l/višinski meter krošnje/ha; maksimalni odmerek 3,3 l/ha
PRESTOP	2 kg/ha; 0,2-0,4 %
PROLECTUS	330 g sredstva/višinski meter krošnje/hektar, maksimalni odmerek 1 kg/ha
SERENADE ASO	8 l/ha
SIGNUM	0,25 kg/višinski meter krošnje/ha; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha
SWITCH 62,5 WG	0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha
ZENBY	0,9 l/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 24.02.2022 13:54

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

