

10. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 24.02.2022 13:56 - Zaključeno

**Breskova kodravost (*Taphrina deformans*) in listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)**

Nasadi zgodnjih sort breskev in nektarin so v fenološki fazi C - D po Baggioliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (črna listi odprti). Za zatiranje **breskove kodravosti** uporabite registrirana **organska pripravka** Syllit 400 SC v odmerku 2,25 l/ha ali Syllit 544 SC v odmerku 1,65 l/ha.

V ravninskih nasadih oz. na poznih sortah, kjer so brsti napeti pa za zatiranje **breskove kodravosti** in **listne luknjičavosti koščičarjev** lahko še uporabite **bakrove pripravke**. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Registrirana sredstva na osnovi **bakra**:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 24.02.2022 13:56

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

