

3. VARSTVO BRESKEV - 18.03.2022 13:49 - Zaključeno



Brsti koščičastih sadnih vrst so v JV Sloveniji močno nabrekle in pri breskvi se brsti že razpirajo. Vidni so svetlo zeleni deli brsta (52 – 53 po lestvici BBCH). Marelice so po razvoju še zgodnejše.

Ob odsotnosti padavin ni velike nevarnosti za okužbe z **breskovo kodravostjo**. Kljub temu je smiselno v nasadih breskev v naslednjih dneh, skladno z razpiranjem brstov, opraviti preventivno varstvo pred glivičnimi obolenji. Kjer so konice lističev že toliko razvite, da bi jih baker poškodoval, uporabite **SYLLIT 400 SC** (2,25 l (ha/ha) ali **SYLLITE 544 SC** (1,65 l/ha). Sicer pridejo v poštev še sredstva na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha proti breskovi kodravosti in 2,0 kg proti listni luknjičavosti koščičarjev), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), BADGE WG (3,5 kg/ha; le listna luknjičavost), NORDOX 75 WG (2 kg/ha).

Pregrevanje debel in izpostavljanje pozebi ter glivičnim okužbam lahko oslabite z **beljenjem debel z apnenim beležem**, oz. **kaolinskimi glinami**, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje upočasnili.

Poskrbite za kvaliteten nanos z večjo porabo vode (priporočena količina je od 350 do 700 l/ha) in zaščitite tudi vrhove dreves.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 18.03.2022 13:49

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

