

6. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 24.03.2022 14:02 - Zaključeno



Breskve in nektarine so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi odprtega brsta (BBCH 53) in prehajajo v fenološko fazo D (BBCH 55), pri vegetativnih brstih pa so vidni zeleni listni vršički (BBCH 09). Trenutne vremenske razmere zaradi suhega vremena ne ustvarjajo pogojev za okužbe z breskovo kodravostjo. Vremenska napoved v prihodnjem tednu napoveduje možnost padavin. Spremljajte vremensko napoved in **pred dežjem preventivno poškropite breskve in nektarine proti breskovi kodravosti s pripravkom: Syllit 400 SC** (2,25 L/ha). Pripravek Syllit 544 SC (1,65 L/ha), ki je prav tako registrirana za zatiranje breskove kodravosti ni v prodaji.

Datum objave obvestila: 24.03.2022 14:02

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

