

13. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 24.03.2022 15:11 - Zaključeno



V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fenofazi brstenja (BBCH 53). Na posameznih izpostavljenih legah v Vipavski dolini in Slovenski Istri so zgodnje sorte jablan že v fenofazi mišjega ušesa (BBCH 54), zgodnje sorte hrušk pa so že dosegajo fenofazo zelenega popka (BBCH 56).

Pred napovedanimi padavinami je potrebno nasade pečkarjev poškropiti proti škrlupu. V nasadih, ki brstijo je zdaj pravi čas za uporabo bakrenih pripravkov.

Uporabite lahko:

Sredstvo	Odmereki, konc.
Badge WG WG	2,9 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3,0 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	3,0 kg/ha
Cuprablau Z 50 WP	2,0 kg/ha
Kocide 2000	2 kg/ha
Nordox 75 WG	1,6 kg/ha

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti **hruševemu ožigu**, zato je njihova uporaba priporočljiva v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, zelo priporočljiva pa je zlasti na območju spodnje Vipavske doline, kjer je prisoten hrušev ožig.

V nasadih jablan in hrušk, ki so že v fenofazi mišjega ušesa oz. zelenega popka priporočamo, da pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje s kontaktnimi fungicidi.

Uporabite lahko:

Sredstvo	Odmerek, konc.
Polyram DF	2,0 kg/ha
Merpan 80 WDG	1,88 kg/ha
Scab 80 WG	1,9 kg/ha
Scab 480 SC	3,13 L/ha
Orthocide 80 WG	2,0 kg/ha
Syllit	1,9 L/ha
Syllit 544 SC	1,4 L/ha

Jablanov cvetožer (*Anthonomus pomorum*)

Jablanov cvetožer je v tem obdobju že lahko prisoten v nasadih jablan, kjer se hrani na brstih. Na pojav škodljivca bodite pozorni zlasti

na območju Brkinov ter na ostalih območjih, kjer nasadi mejijo na gozdove. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo na cvetovih. Za zatiranje cvetožera lahko uporabite pripravek **Imidan 50 WG** v odmerku 1,0 kg/ha. ali pripravek ASET FIVE v odmerku 0,64 – 0,96 L/ha, ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in katerega raba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Datum objave obvestila: 24.03.2022 15:11

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024