

## 14. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 25.03.2022 09:03 - Zaključeno



### Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)

V Brkinih so nasadi poznih sort sliv in češpelj (Domača, Stanley) v fenofazi BBCH51-53. Priporočamo, da sadovnjake škropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev**.

Za škropljenje uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

| Sredstvo          | Odmerek ali koncentracija |
|-------------------|---------------------------|
| Badge WG          | 3,5 kg/ha                 |
| Champion 50 WG    | 2-3 kg/ha                 |
| Cuprablau Z 35 WG | 1,6-2 kg/ha               |
| Cuprablau Z 35 WP | 2 kg/ha                   |

Za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev na slivah je bilo izdano dovoljenje za nujne primere za pripravek Curatio žvepleno apnena brozga. Sredstvo se uporablja v odmerku 6 l/ha na meter višine krošnje.

**Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 25.03.2022 09:03

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

