



Osrednja Slovenija - Kmetijski inštitut Slovenije / Koščičarji / 9. Varstvo koščičarjev

9. Varstvo koščičarjev - 29.03.2022 10:40 - Zaključeno



Na iz postavljenih legah marelice že cvetijo. V kolikor je odprtih vsaj 10 % cvetov je pred padavinami potrebno opraviti škropljenje proti **cvetni moniliji** saj so odprti cvetovi zelo občutljivi na okužbe z glivo. Uporabite lahko enega izmed naslednjih registriranih sredstev: **Amylo-X, Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Prestop, Prolectus, Serenade aso, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby.**

Fenološki razvoj nektarin in breskev je glede na sorte in lokacije zelo različen. Na hladnejših legah, kjer so drevesa šele v stadiju odpiranja brstov, je pred napovedanim dežjem potrebno opraviti škropljenje proti **breskovi kodravosti** oz. **listni luknjičavosti koščičarjev** z enim od bakrovih pripravkov: **Cuprblau Z 35 WP, Nordox 75 WG, Badge WG**. V nasadih, ki so že napredovali v razvoju (BBCH 53+) in bi baker poškodoval konice zelenih lističev opravite škropljenje proti **breskovi kodravosti** s fungicidnim sredstvom **Syllite 544 SC** ali **Syllite 400 SC**. Optimalen čas uporabe pripravkov **Syllite 544 SC** in **Syllite 400 SC** je med razvojnima stadijema BBCH 53 in BBCH 56. Sredstvi lahko uporabite do konca cvetenja (BBCH 69) v kolikor ležijo vaši nasadi na toplih legah in že začenejo cveteti je pred padavinami potrebno cvetove zaščititi s fungicidno oblogo, ki preprečuje okužbe s **cvetno monilijo**. Škropljenje opravite pred dežjem in le v primeru, da je odprtih več kot 10% cvetov. Uporabite lahko enega izmed naslednjih sredstev: **Amylo -X, Chorus 50 WG, Luna experience, Switch 62,5 WG, Prolectus, Signum** ali **Zenby**.

Češnje, višnje, češplje in slive so v fazi brsenja. Na nekaterih toplih lokacijah že odsegajo fazo BBCH 55, ko so vidni posamezni cvetni popki (še vedno zaprti), na kratkih pecljih, zelene luske pa so rahlo razprte. Pred padavinami opravite škropljenje proti **listni luknjičavosti koščičarjev** in **rožičavosti češpelj** s pripravki na osnovi bakra. Na voljo sta pripravka **Badge in Champion 50 WG** ter **Cuprblau Z 35 WG** in **Cuprblau Z 35 WP**, slednja imata registracijo le proti **listni luknjičavosti**. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami. V kolikor ležijo vaši nasadi na zgodnjih legah in pričakujete, da bo pred napovedanim dežjem odprtih več kot 10% cvetov, opravite škropljenje proti **cvetni moniliji** z enim od naslednjih pripravkov: **Amylo -X, Chorus 50 WG, Luna experience, Switch 62,5 WG, Prolectus, Signum** ali **Zenby**.

Nalet **češpljeve grizlice** običajno sovпада s cvetenjem sliv. Za spremljanje prisotnosti škodljivca izobesite bele lepljive plošče v nasadih, ki cvetijo.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in jih upoštevajte!

Pripravil: David Snoj

Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 29.03.2022 10:40

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

