

10. Varstvo pečkarjev - 05.04.2022 12:07 - Zaključeno



Ohladitev v preteklih dneh je nekoliko upočasnila razvoj sadnega drevja. Padavine so bile na večjem delu Slovenije obilne in so sprale fungicidno oblogo. Za varstvo pred **škrlopom** svetujemo, da nasade jablan in hrušk ponovno poškropite z ustreznimi fungicidi.

Do cvetenja jablan in hrušk je priporočljiva uporaba kontaktnih pripravkov na osnovi ditianona (**Alcoban**), metirama (**Polyram DF**) ali dodina (**Syllit 400 SC**, **Syllit 544 SC**). V ekoloških nasadih lahko opravite škropljene z žvepleno-apneno brozgo (pripravek **Curatio**).

Na hladnejših legah za varstvo poznejših sort, ki so še v fazi mišjega ušesca lahko ponovno uporabite katerega od bakrovih fungicidov kot so **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP**, **Cuprablau Z 50 WP**, **Kocide 200**.

V nasadih, kjer fenološki razvoj jablan potek počasneje, bodite še vedno pozorni na pojav **jablanovega cvetožera**. Prag škodljivosti je presežen, ko je poškodovanih preko **15 %** brstov v nasadih z **malo** cvetnega nastavka ali **30 %** v nasadih z **veliko** cvetnega nastavka. Pridelovalci pregledujte nasade in ob preseženem pragu škodljivosti ukrepajte. Na voljo sta insekticidna pripravka **Imidan 50 WG** ter **Asset Five** (dovoljen tudi v ekološki pridelavi). Uporaba sredstva **Asset Five** je dovoljena do razvojne faze BBCH 54. Po potrebi se tretiranje ponovi 7 dni po prvem škropljenju.

Zaradi varstva čebel je potrebno opraviti škropljenje z insekticidi opraviti najkasneje 14 dni pred cvetenjem in v primeru cvetoče podrasti to tudi predhodno pokositi.

Pred cvetenjem jablan in hrušk lahko v nasadih, kjer imate več težav z obvladovanjem **ameriškega kaparja**, uporabite pripravek **Harpun**.

Za odvrčanje **hruševe bolšice** je do cvetenja hrušk priporočljivo obnavljati nanos kaolinskih glin. Kjer ste imeli v preteklih letih več težav z obvladovanjem hruševe bolšice je pred cvetenjem smiselna uporaba insekticida **Harpun**. Pripravek učinkovito deluje na ličinke zgodnjih razvojnih stadijev, zato je za določitev optimalnega časa rabe potrebno spremljati razvoj škodljivcev in ukrepati ob pričetku izleganja ličink iz jajčec. Boljšo učinkovitost zatiranja dosežemo, če uporabo insekticida kombiniramo z oljnimi pripravki (npr. **Ovitex** ali **Frutapon**).

V nasadih, ki so tik pred cvetenjem izobesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta **jabolčne in hruševe grizlice**. Prag škodljivosti je presežen, če se do konca cvetenja ujame na ploščo najmanj 30 osic. Proti grizlicam se ukrepa šele po koncu cvetenja.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in jih upoštevajte!

Datum objave obvestila: 05.04.2022 12:07

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

