



## 11. Varstvo koščičarjev - 05.04.2022 12:11 - Zaključeno



Nestanovitno vreme v obdobju cvetenja breskev, višenj in češenj je ugodno za širjenje okužb s **cvetno monilijo**. Za preventivo varstvo pred omenjeno boleznijo je priporočljivo opraviti dvoje škropljenj. Prvo škropljenje opravimo ob začetku cvetenja, ko je odprtih najmanj 10 % cvetov. Drugič je potrebno škropiti po koncu polnega cvetenja, ko začno odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko naslednje registrirane fungicide **Chorus 50 WG** (breskev), **Duaxo koncentrat** (češnja, višnja), **Luna experience**, **Prolectus**, **Signum**, **Switch 62,5 WG**, **Zenby** (breskev, višnja, češnja) ali **Teldor SC 500** (češnje, višnje). Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi mikroorganizmov kot so **Serenade ASO** (breskev), **Amylo-X**, **Prestop** ali **Taegro** (breskev, višnja, češnja).

Za varstvo breskev in nektarin pred **breskovo kodravostjo** lahko v do konca cvetenja ponovno uporabite sredstvi **Syllit 544 SC** ali **Syllit 400 SC**. Škropljenja opravite pred napovedanimi padavinami.

V nasadih koščičarjev po cvetenju občasno škodo povzročajo tudi gosenice **malega zimskega pedica**, ki se prehranjujejo na listih rastlin. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite sredstvo **Agree WG** ali pripravek **Neemazal**. Oba pripravka sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Tretiranje se opravi v času izleganja gosenic škodljivih metuljev.

**Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in jih upoštevajte!**

Datum objave obvestila: 05.04.2022 12:11

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon**. Uredila: **Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

