

14. VASTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 06.04.2022 13:42 - Zaključeno



Zgodnje sorte češenj na šibkih podlagah prehajajo iz fenološke faze stadija balona BBCH 59 v fazo začetka cvetenja BBCH 61. Pozne sorte češenj in višenj so v fenološki fazi belega popka BBCH 57. Toplo vreme z napovedanimi visokimi temperaturami zraka do konca tedna bo ugodno vplivalo na razvoj cvetnih brstov, zato spremljajte njihov razvoj.

Svetujemo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko je odprtih 10 % cvetov. V primeru deževnega vremena v času cvetenja, opravite še eno oz. drugo škropljenje v času, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Škropljenje češenj in višenj opravite z enim od pripravkov kot so: **Luna experience** (0,2 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), **Signum** (0,25 kg/ha na 1m višine krošnje, do največ 0,75 L/ha), **Revyona** (1,8 L/ha), **Duaxo koncentrat** (1,1 L/ha na 1m višine krošnje, do največ 3,3 L/ha) ali **Zenby** (0.9 L/ha)

Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus amyloliquefaciens* kot so: **Amilo -x** (1,5 - 2,5 kg/ha), **Serenade ASO** (8 L/ha), **Taegro** (0,185-0,37 kg/ha ali na osnovi glive *Gliocladium catenulatum* kot je **Prestop** (2 kg/ha), ki imajo dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Samo za češnje so proti cvetni moniliji registrirani tudi pripravki kot so: **Switch 62,5 WG** (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Teldor SC 500** (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1,5 L/ha) in **Prolectus** (330 g/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha)

OPOZORILO: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Datum objave obvestila: 06.04.2022 13:42

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

