



## 15. VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ - 06.04.2022 13:44 - Zaključeno



Slive in češplje glede na sorte in lege v povprečju prehajajo v fenološko fazo stadija balona BBCH 59, na izpostavljenih legah pa dosegajo fazo prvih odprtih cvetov. Toplo vreme z napovedanimi visokimi temperaturami zraka do konca tedna bo ugodno vplivalo na razvoj cvetnih brstov, zato spremljajte njihov razvoj.

Svetujemo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko je odprtih 10 % cvetov. V primeru deževnega vremena v času cvetenja, opravite še eno oz. drugo škropljenje v času, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Škropljenje sliv in češpelj opravite z enim od pripravkov kot so: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha), **Luna experience** (0,2 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), **Signum** (0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,75 L/ha), **Prolectus** (330 g/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Revyona** (1,8 L/ha), **Switch 62,5 WG** (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Zenby** (0,9 L/ha)

Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus amyloliquefaciens* kot so: **Amilo -x** (1,5 - 2,5 kg/ha), **Serenade ASO** (8 L/ha), **Taegro** (0,185-0,37 kg/ha ali na osnovi glive *Gliocladium catenulatum* kot je **Prestop** (2 kg/ha), ki imajo dovoljenje tudi za uporabo v ekološki pridelavi.

Svetujemo, da za spremljanje pojava **rumene ali črne češpljeve grizlice**, **izobesite bele lepljive plošče**. Samo v primeru, da boste na bele lepljive plošče ulovili skupaj več kot 30 osic **rumene ali črne češpljeve grizlice**, **po končanem cvetenju** opravite škropljenje proti omenjeni škodljivki s pripravkom **Mospilan 20 SG**, v 0,04 % konc.

**OPOZORILO:** Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrastu ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Datum objave obvestila: 06.04.2022 13:44

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

