



19. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 06.04.2022 15:15 - Zaključeno



Nasadi jablan so na stopnji zelenih in rožnatih popkov (56 – 57 po lestvici BBCH).

Z nestanovitnim vremenom se bo pojavila možnost okužb z **jablanovim škrlupom**. Izbruhi prvih askospor so običajno šibkejši, a kljub temu je potrebno varstvo s sintetičnimi fungicidi opraviti pred naslednjimi padavinami. Uporabite lahko: **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha; sredstvo syllit ni priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji), **MERPLUS** (2 l /ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha). Pripravke kot so: **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **FABAN** (1,2 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravično delovanje, bomo umestili v varstvu kasneje, ko bodo nevarnosti za okužbe resnejše. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

S segrevanjem ozračja nad 15 °C je proti **jablanovi pepelovki** priporočljivo dodati tudi enega od pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**.

Pred cvetenjem je smiselno opraviti tudi varstvo pred **mokasto jablanovo ušjo** (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov) s pripravkom: **TEPEKI**, **AFINTO** (oba 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l/ha na višinski meter krošnje) ali **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje še na **krvavo uš** in je dovoljen za ekološko pridelavo.

Pridelovalce opozarjamo na primeren čas za nameščanje **feromonskih razpršilcev za metodo zbeganja**. Razpršilce (ISOMATE C TT, RAK 3) je potrebno v nasadu namestiti pred začetkom cvetenja, skladno z navodili proizvajalca, kar sovpada z začetkom leta **jabolčnega zavijača**.

Svetujemo nadaljevanje zaščitnega pristopa z **metodo odvracanja sesajočih žuželk** (predvsem **hruševih bolšic**) z nanosom **kaolinskih glin**. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. **CUTISAN** ali **MALUSAN** (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

V nasadih hrušk, ki so močnejše napadeni s **hruševo bolšico**, oz. v nasadih jablane z **ameriškim kaparjem** lahko pred cvetenjem uporabite tudi pripravek **HARPUN** (1 l/ha proti hruševi bolšici; 0,5 l/ha proti amerškemu kaparju). Pri tem pazite na varstvo čebel!

V nasadih jablan bodite pozorni tudi na nalet **vrtnih zavrtačev**, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo **alkoholnih pastí** (rdeče barvne plošče **REBELL ROSSO** ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 06.04.2022 15:15

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

