



14. VARSTVO PEČKARJEV - 11.04.2022 13:06 - Zaključeno



Počasi prehajamo v obdobje nestanovitnega aprilskega vremena, ki predstavlja tveganje za zdravstveno varstvo rastlin. Zato pridelovalcem priporočamo redno spremljanje vremenskih napovedi. Relativno hladni dnevi so nekoliko upočasnili razvoj sadnega drevja. Jablane so v razvojni fazi rožnatega popka do balonskega stadija.

Ob naslednjih padavinah pričakujemo veliko nevarnost okužb z jablanovim škrlupom, zato sadjarje opozarjamo na dosledno izvajanje varstvenih ukrepov. Pred naslednjimi napovedanimi padavinami poskropite nasade z enim od kontaktnih fungicidov. Priporočamo uporabo sredstev na osnovi ditianona (**Delan Pro, Alcoban**), metirama (**Polyram DF**) in dodina (**Syllit 400 SC, Syllite 544SC**), dodin ima tudi kurativno delovanje. Sredstvo se ne sme mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji.

V ekoloških nasadih lahko opravite škropljene z žvepleno-apneno brozgo (pripravek **Curatio**).

Pred napovedanimi, dolgotrajnimi padavinami ali v primeru, da ste s škropljenjem zamudili, lahko uporabite enega izmed sistemskih pripravkov, ki delujejo tudi kurativno. V hladnem vremenu se priporoča uporaba sredstev iz skupine anilinopirimidinov kot s **Chorus 50 WG, Pyrus 400 SC, Scala, Pyramid, Batalion 450 SC**. Sistemskim fungicidom je **obvezno** potrebno dodati enega izmed predhodno naštetih sredstev s kontaktnim delovanjem, razen sredstvu **Faban**, ki ima že dodan kontaktni fungicid.

Dnevne temperature že presegajo 15°C zato je za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočljivo dodajati škropilni brozgi sredstva na osnovi **žvepla**. Uporabite lahko naslednje pripravke: **Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specila, Microthiol dispers, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC, Symbiotica Fito** –tekoče žveplo, **Azumo WG** ali **Vertipin**.

Pred cvetenjem je v času balonskega stadija potrebno posvetiti pozornost tudi mokasti uši. Če je prag škodljivosti presežen (1-2 koloniji /100 poganjkov) je potrebno opraviti škropljenje. Uporabite lahko sredstvi **Teppeki** in **Afinto**, ki kažeta določeno mero učinkovitosti tudi proti krvavi uši ali **NeemAzal T/S**, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Pred cvetenjem je v ekoloških nasadih proti jabolčnemu zavijaču potrebno obesiti feromonske razpršilce za metodo zbeganja, uporabite lahko **Isomate C TT** in **RAK 3**.

Pred cvetenjem jablan in hrušk lahko v nasadih, kjer imate več težav z obvladovanjem ameriškega kaparja, uporabite pripravek **Harpun**.

V nasadih hrušk je do cvetenja še vedno čas za odvrčanje hruševe bolšice z nanašanjem kaolinskih glin (**Cutisan, Malusan**) ter za zatiranje izleženih ličink tudi sredstvo **Harpun**.

V nasadih, ki so tik pred cvetenjem izobesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta jabolčne in hruševe grizlice. Prag škodljivosti je presežen, če se do konca cvetenja ujame na ploščo najmanj 30 osic. Proti grizlicam se ukrepa šele po koncu cvetenja.

Datum objave obvestila: 11.04.2022 13:06

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

