



15. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 11.04.2022 13:08 - Zaključeno



Na večini lokacij so koščičaste vrste v fazi polnega cvetenja ali zaključujejo s cvetenjem (breskve). Drugo škropljenje proti **cvetni moniliji** je potrebno opraviti po koncu polnega cvetenja, ko začno odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko naslednje registrirane fungicide:

Breskve in nektarine: Chorus 50 WG, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby, Revyona. Pripravki na osnovi mikroorganizmov: Amylo-X, Prestop, Taegro, Serenade ASO.

Češnje in višnje: Luna experience, Signum, Revyona, Duaxo koncentrat, Zenby. Pripravki na osnovi mikroorganizmov: Amylo-X, Prestop, Taegro, Serenade ASO.

Slive in češplje: Luna experience, Chorus 50 WG, Prolectus, Revyona, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby. Pripravki na osnovi mikroorganizmov: Amylo-X, Prestop, Serenade ASO.

Za spremljanje naleta **češpljevih grizlic** je v času cvetenja potrebno izobesiti bele lepljive plošče.

Za varstvo breskev in nektarin pred **breskovo kodravostjo** lahko do konca cvetenja uporabite sredstvi **Syllit 544 SC** ali **Syllit 400 SC**. Škropljenja opravite pred napovedanimi padavinami.

Datum objave obvestila: 11.04.2022 13:08

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

