



16. VARSTVO VINSKE TRTE - 11.04.2022 13:10 - Zaključeno



Tudi vinska trta pričinja z brstenjem. Na toplejših legah se pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, brsti že odpirajo. Na drugih območjih glavnina sort postopoma prehaja v stadij volne (BBCH 05). V tem obdobju je ustrezen čas za uporabo žveplovih pripravkov za zatiranje trsne listne pršice šiškarice (erinoza) in pršice trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom škodljivih pršic.

Uporabite lahko registrirane pripravke kot so **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol disperss**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku do 8 kg/ha. Žveplovni pripravki delujejo tudi proti **oidiju** ter zmanjšujejo okužbe s **črno pegavostjo vinske trte**. Za učinkovito delovanje žveplovih pripravkov morajo temperature podnevi dosegati najmanj 15 °C. Do konca brstenja lahko za zatiranje škodljivih pršic (rdeča sadna pršica, gabrova pršica) uporabite tudi pripravek **Red fox**, ki je na osnovi mešanice parafinskega olja in bakra ter vpliva tudi na zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vinske trte

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih sredstev pokosite cvetočo podrast in opravite aplikacijo sredstev v večernem času.

Datum objave obvestila: 11.04.2022 13:10

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

[Seznam registriranih FFS](#)

