

22. VARSTVO BRESKEV - 13.04.2022 14:52 - Zaključeno



Nasadi breskev cvetijo (65 - 69 po lestvici BBCH).

Za preprečevanje okužb s **cvetno monilijo** priporočamo ob odpadanju venčnih listov ponovno tretiranje z enim od sredstev kot so: **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **PROLECTUS** (1 kg/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **SWTCH 62,5 WG** (1 kg/ha), oziroma tudi v ekološki pridelavi dovoljene **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **PRESTOP** (2 kg/ha) ali **TAEGRO** (0,185-0,37 kg/ha).

Do zaključka cvetenja ahko za varstvo pred **breskovo kodravostjo** uporabite še **SYLLIT 400 SC** (2,25 l (ha/ha) ali **SYLLITE 544 SC** (1,65 l/ha).

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 13.04.2022 14:52

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

