



19. VARSTVO PEČKARJEV - 20.04.2022 07:23 - Zaključeno



Nasadi jablan so sedaj v polnem cvetenju, medtem ko hruške odcvitajo ali pa so že popolnoma odcvetele. Ob nadaljevanju nestanovitnih vremenskih razmer ostaja nevarnost za okužbe s **škrlupom** še naprej velika, zato sadjarje opozarjamo na dosledno izvajanje varstvenih ukrepov. Svetujemo, da pred naslednjimi napovedanimi padavinami nasade ponovno poškropite z enim od kontaktnih fungicidov. Priporočamo uporabo sredstev na osnovi ditianona (**Delan Pro**, **Alcoban**) ali metirama (**Polyram DF**). V ekoloških nasadih lahko proti škrlupu uporabite tudi žvepleno-apneno brozgo **Curatio**, ki deluje tudi proti **jablanovi pepelovki**.

V primeru napovedi dolgotrajnejših padavin ali v primeru, da ste s škropljenjem zamudili, lahko uporabite katerega izmed pripravkov s sistemsko učinkovitostjo, ki delno delujejo tudi kurativno. V hladnejšem vremenu je pri izbiri priporočljivo dati prednost pripravkom z aktivnimi snovmi iz skupine anilinopirimidinov kot so: **Chorus 50 WG**, **Pyrus 400 SC**, **Scala**, **Pyramid**, **Batalion 450 SC** ali **Mythos**. Sicer pa lahko uporabite tudi druge sistemske pripravke kot so **Difcor 250 EC**, **Duaxo koncentrat**, **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC** ali **Revyona**. Pri škropljenju s sistemskimi fungicidi je potrebno upoštevati antirezistenčno strategijo in vse našete pripravke kombinirati z enim izmed predhodno naštetih sredstev s kontaktnim delovanjem. Uporabite lahko tudi kombiniran pripravek **Faban**, ki ima že dodan kontaktni fungicid.

Za zatiranje **jablanove pepelovke** škropilni brozgi dodajte pripravek na osnovi **močljivega žvepla** kot so **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol sulphur 800 SC**, **Symbiotica Fito –tekoče žveplo**, **Azumo WG** ali **Vertipin**. V močno okuženih nasadih lahko uporabite tudi enega izmed fungicidov s sistemskim delovanjem kot so **Luna experience**, **Sercadis**, **Sercadis Plus**, **Stroby WG**, **Tercel** ali **Zato 50 WG**. Za učinkovito varstvo pred jablanovo pepelovko je potrebno dosledno izrezovanje in odstranjevanje okuženih poganjkov iz nasada. Zgolj uporaba fungicidov nima zadostnega učinka.

Do cvetenja je v primeru preseganja praga škodljivosti še možno ukrepati proti listnim ušem. Nevarna je zlasti **mokasta uš**, ki se v primeru večjega potenciala in ustreznih vremenskih razmer lahko prerazmnoži že v času cvetenja. Prag škodljivosti je presežen, če pri pregledu 100 poganjkov v povprečju odkrijete več kot 1-2 koloniji mokaste uši. Uporabite lahko insekticida **Teppeki** in **Afinto** ali pa pripravek **NeemAzal T/S**, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Pred cvetenjem je v sadovnjakih kjer varstvo pred **jabolčnim zavijačem** temelji na metodi zbežanja, potrebno obesiti feromonske razpršilce. Uporabite lahko **Isomate C TT**, **RAK 3**, **SemiosNET-Codling Moth** ali **Checkmate puffer CM-Pro**.

Sedaj je tudi skrajni čas za izobežanje belih lepljivih plošč s katerimi v sadovnjakih lahko spremljate nalet **jabolčne in hruševe grizlice**. Prag škodljivosti je presežen, če se do konca cvetenja ujame na ploščo najmanj 30 osic. Proti grizlicam z ustreznimi insekticidi ukrepamo šele po koncu cvetenja.

Preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte. Pred uporabo insekticidov v nasadih pokosite cvetočo podrast in škropljenje opravite v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Datum objave obvestila: 20.04.2022 07:23

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož in SNOJ David

Pripravila: **Primož Žigon in David Snoj**

Seznam registriranih FFS

