



31. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED PLEVELI - 20.04.2022 12:23 - Zaključeno



Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Po potrebi pa uporabimo tudi herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja

V nižinah Primorske ste že posadili krompir in je že vzkalil ali pa je sedaj v fazi vznika, v višjih legah pa se šele pripravljate na saditev krompirja. Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Mehansko zatiranje plevelov je tudi edino, ki ga lahko uporabijo ekološke kmetije. Pri integrirani pridelavi po potrebi uporabimo tudi herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja. Priporočamo, da se pri izbiri herbicida držite navodil o uporabi in ste posebej pozorni na fazo rasti krompirja, da ne bi prihajalo do nepotrebnih fitotoksičnosti in zastojev rast pri krompirju. Seznam registriranih herbicidov v krompirju je na voljo tukaj

Pripravila: Anka Poženeš, univ.dipl.inž.agr.

SEZNAM HERBICIDOV V KROMPIRJU 2022

PRED SADITVIJO KROMPIRJA

PRIPRAVEK	ODMEREK	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE	K
CREDIT XTREME Glifosat (izopropilamino sol) - 40,08% glifosat kalijeve soli) - 29,77%	1,33 – 4,0 l/ha	Za zatiranje vzniklega enoletnega, dvoletnega in večletnega plevela.	V času pred saditvijo	ČU
ROUNDUP POWERMAX Glifosat - 79,2% (kot amonijska sol)	1 kg/ha Datum porabe zalog: 17.11.2022	Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela.	V času 7 do 10 dni pred sajenjem	ČU

PO SADITVI PRED VZNIKOM KROMPIRJA

STOMP AQUA Pendimetalin - 45,5%	2,9 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekatere vrste širokolistnega plevela Tretiramo pred vznikom!	Seme mora biti dobro prekrito z zemljo. Snovi ni dovoljeno uporabljati v tleh, ki imajo organske mase nad 6%	ČU
SHARPEN 33 EC Pendimetalin - 33%	3,0-5,0 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Tretira se pred vznikom , po oblikovanju grebenov	Varnostni pas 30 m ob vodah 1. reda in 2. reda. Ne tretira se posevka, ki je v stresu. Slabo zatira slak.	ČU

SHARPEN PLUS (staro ime: SHARPEN 40 SC) Pendimetalin - 40%	2,5-4,0 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Tretira se pred vznikom , po oblikovanju grebenov	Slabo zatira slak. Varnostni pas 30 m ob vodah 1. reda in 2. reda.	ČU
STALLION SYNC TEC Klomazon -3% + pendimetalin - 33,3%	3,0 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pimice Tretiramo čim prej po saditvi do najpozneje 7 dni pred vznikom	Seme mora biti dobro pokrito z zemljo (najmanj 25 mm). Ne sme se uporabljati v semenskem krompirju. Varnostni pas 20 m do vodnih površin.	ČU
ANGELUS Klomazon - 36%	0,25 l/ha	Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela. Tako po setvi in pred vznikom posevka, v razvojni fazi do začetka tvorbe stebela Kolobarne omejitve!	Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal. Ne uporabljati v tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske snovi.	ČU
CLOMATE Klomazon - 36%	0,25 l/ha Datum veljavnosti: 31.10.2022	Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela. Po sajenju, pred vznikom nasada, vendar najpozneje 7 dni po sajenju. Kolobarne omejitve!	Gomolji gojenih rastlin naj bodo med tretiranjem prekriti z vsaj 2 cm prsti. Na peščenih tleh z vsebnostjo organske snovi pod 1 % niso izključene poškodbe gojenih rastlin.	ČU
SINOPIA Klomazon 2,4% Metobromuron 40%	3 l/ha	Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevela in omejevanje navadne kostrebe	Uporaba takoj po sajenju gomoljev (do 5 dni po sajenju), pred vznikom krompirja.	ČU
METRIC Klomazon - 6% + Metribuzin - 23,3%	1,5 l/ha	Strakonja, pasje zelišče	Ne sme se uporabljati na zelo lahkih in peščenih tleh. Ne uporabljati v tleh, kjer je več kot 10 % organske snovi. Po izkopu krompirja ne sejati strniščne repe!	ČU
	1,0 l/ha	Za zatiranje ostalih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov Uporabljamo 7 dni pred vznikom krompirja		
SENCOR SC 600 Metribuzin 60%	0,75 l/ha	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli Po sajenju pred vznikom	Varnostni pas 15 m ob voda 1. reda in 5 m ob voda 2. reda	42 dni
BUZZIN Metribuzin 70%	0,75 kg/ha	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaj vrst ozkolistnega plevela Tik pred vznikom	Kolobarne omejitve!	ČU
PLATEEN WG 41,5 Flufenacet -	2,0 – 2,5 kg/ha	Za enoletne ozkolistne in širokolistne plevele Pred vznikom krompirja		ČU

24% + metribuzin - 17,5%				
BOXER Prosulfokarb -80%	5,0 l/ha	Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevla Tik pred vznikom	Ne obdelujemo zemlje, dokler krompir ne vznikne	ČU
PROMAN Metobromuron -50%	3,0 l/ha	Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov. Tretiramo samo pozne in srednje pozne sorte (z več kot 115 dni rasti)	Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 10 m od voda 2. reda. Tretiranega krompirja ne smemo uporabljati za krmo živali! Kolobarne omejitve!	ČU
CHALLENGE Aklonifen - 60%	4 l/ha	Za širokolisten in nekaj ozkolistnih plevlov Po saditvi pred vznikom krompirja	Varnostni pas 20 m od voda 1. in 2. reda	90 dni
CHANON Aklonifen - 60%	3,0 l/ha	Za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela.	Uporaba po sajenju, vendar pred vznikom krompirja.	ČU

PO VZNIKU KROMPIRJA

PRIPRAVEK	ODMEREK	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE	K
SENCOR SC 600 Metribuzin - 60%	0,15 l/ha	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni plevli Po vzniku krompirja, ko je na glavnem stebelu največ 9 listov	V primeru naknadnega vznika plevla se ponovno tretira (razmak 10-14 dni) V fazi od kličnih listov do 2 listov plevla	42 dni
TAROT 25 WG Rimsulfuron - 25%	40,0 g/ha + močilo	Za zatiranje širokolistnega ter enoletnega ozkolistnega plevela	Zatiramo v fazi od 3 listov do najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst krompirja. Tretiramo, ko ima plevel 2-3 liste	ČU
	50,0g/ha + močilo	Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega ter večlet. ozkolistnega tudi navadne kostrebe		
RIM25 WG Datum veljavnosti: 30.04.2022. Rimsulfuron - 25% = RINCON 25	60 g/ha + 0,1 % močilo	Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla. Uporaba, ko ima krompir od 1- 7 listov (do začetka sklepanja vrst	Optimalni čas za tretiranje s sredstvom je po vzniku plevela, ko ima ozkolistni plevel od 3-5 listov in širokolistni plevel od 2-4 liste	ČU

SG					
RIMURON 25 WG Rimsulfuron - 25%	V enkratnem odmerku: 50 g/ha + močilo 0,2 L/ha	Za zatiranje nekaterih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov ter večletnih ozkolistnih plevelov, po vzniku.	Tretira se, ko ima krompir vsaj 9 listov oz. je višji od 4cm, do faze začetka rasti glavnih stebel, ko je nižji od 20cm.		ČU
	Dve deljeni tretiranj: 30 g/ha + 20 g/ha + močilo 0,2 L/ha	Za zatiranje nekaterih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov ter večletnih ozkolistnih plevelov, po vzniku.	Tretira se, ko ima krompir vsaj 9 listov oz. je višji od 4cm. Drugo tretiranje se izvede 8-10 dni po 1. tretiranju, do faze začetka rasti glavnih stebel, ko je nižji od 20 cm. Na isti površini dovoljeni dve deljeni (split) tretiranj v eni rastni sezoni.		
BASAGRAN 480 Bentazon -48%	1,5-2,0 l/ha	Za zatiranje eno – in večlet. širokolistnega plevela. Uporabljamo, ko je krompir visok največ 10 cm	T zraka naj ne presega 25 °C; Za dobro delovanje je potrebno omočiti liste in steblo		42 dni
GRAMINICIDI – HERBICIDI PROTI TRAVNIM PLEVELOM					
ZETROLA Propakvizafop -10% = AGIL 100 EC	0,75 – 1,5 l/ha	Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov V fazi od 3 lista do faze popolne razraščnosti krompirja	Enoletne trave naj bodo v razvojni fazi od 2 listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov) V zgodnjem krompirju uporaba ni dovoljena!		30 dni
FOCUS ULTRA Cikloksidim - 10%	2,0 l/ha ali 1,0 l/ha + 1,0 l/ha močila	Enoletni ozkolistni plevli in samosevna žita		Tretiramo v fazi od 2 do 9 listov krompirja Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda	56 dni
	4,0 l/ha ali 2,0 l/ha + 2,0' l/ha močila	Večletni ozkolistni plevli			
TARGA SUPER Kvizalofop-p-etil -5% Datum veljavnosti: 30.11.2022	1,2 l/ha	Enoletni ozkolistni plevli Od 2 lista do začetka cvetenja krompirja	Tretiranje enoletnih ozkolistnih plevelov od 2 pravih listov do konca razraščanja.		45 dni
	2,0 l/ha	Plazeča pirnica	Tretiranje v razvojni fazi od 4 do 6 listov plevela		
FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl -12,5%	1,6 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljujk, razen enoletne latovke	Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo. Dolga karenc!		90 dni
FUSILADE	0,8- 1,3 l/ha	za zatiranje enoletnega	Tretira se krompir pred		90

FORTE Fluazifop-p-butil -15%		ozkolistnega plevla in ljudk (majhna do srednja zapeveljenost)	cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo; Dolga karenc!	dni
SELECT SUPER Kletodim -12%	1,0 – 2,5 l/ha	Za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha, za zatiranje enoletne latovke v odmerku 2 L/ha; tretira se v razvojni fazi od konca razrašanja naprej za zatiranje plazeče pirnice v odmerku 2,5 L/ha.	Krompir se tretira od razvojne faze razvitega 1. para listov do faze, ko se 30% rastlin stika med vrstami	56 dni
DESIKANTI ZA SUŠENJE KROMPIRJEVE CIME				
BELOUKHA Pelargonska kislina -68%	16 l/ha	Krompirjevko se tretira, ko imajo gomolji željeno debelino za izkop oz. najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja.	Krompirjevko se 1 dan pred uporabo sredstva zmulči na višino 15-20 cm	

K – karenc, **ČU** – karenc zagotovljena s časom uporabe.

Prilpavila: A. Poženel, univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan,11.4.2022, MKGP,URSVHVVR

Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

Pri herbicidih, kjer je opozorilo o kolobarnih omejitvah, je potrebno v navodilu o uporabi to še posebej preveriti in upoštevati pri setvi naslednjih kultur.

Pridelovalce zgodnjega krompirja opozarjamo, da imajo nekateri herbicidi (npr. herbicidi za zatiranje travnih plevelov) dolgo karenc ali pa niso dovoljeni v zgodnjem krompirju.

Prilpavila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

Datum objave obvestila: 20.04.2022 12:23

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Prilpavil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

