

24. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 20.04.2022 13:52 - Zaključeno



Na območju Celjske regije so jabolane v povprečju na opazovane lokacije in sorte vstopile v fenološko fazo **cvetenja BBCH 60 – 63** (odprti prvi cvetovi do odprtih 30 % cvetov), medtem ko so **zgodaj cvetoče sorte v fazi polnega cvetenja BBCH 64-65**. Polno cvetijo tudi hruške.

Sorta	Razvojna faza: Fleckinger	Razvojna faza :BBCH
Carjevič, Summarred	F2	65
Idared, Topaz	F –F2	63 - 65
Jonagold, Breaburn	F	62 -63
Gala,	F	61 - 62
Fuji, Elstar	F	60

Na območju Koroške so jabolane so v fenološki fazi BBCH 57-59, hruške pa prehajajo v fazo polnega cvetenja.

Škrlup

Na sadjarskih lokacijah Celjske regije, kjer smo med 15. in 16. aprilom zabeležili manjšo količino padavin (Bistrica ob Sotli, Braslovče, Slovenske Konjice), so bili izpolnjeni pogoje za lahko okužbo (Ponikva močna okužba). Naslednje padavine smo zabeležili 19. aprila, ko je na sadjarskih lokacijah padlo od 6 do 13 mm dežja. Po zadnjih padavinah smo v Žalcu zabeležili manjši izbruh askospor.

Vremenoslovci v naslednjih petih dneh napovedujejo nestanovitno vreme z možnostjo krajevnih padavin. V kolikor vam vremenske razmere dopuščajo opravite škropljenja jablan in hrušk proti škrlupu pred padavinam, če to ne bo mogoče, pa v roku 24 ur po končanih padavinah. Priporočamo, da uporabite kontaktne oz. površinske fungicide na osnovi a.s. ditianon kot so: **Delan Pro** (2,5 L/ha), **Alcoban** (0,75kg/ha) ali **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha). Prav tako lahko uporabite pripravke iz skupine anilinopirimidinov (dobro delujejo pri nizkih temperaturah) kot so: **Chorus 50 WG** (0,45 kg/ha), **Pyrus 400 SC** (1L/ha), **Scala** (1,125 L/ha), **Pyramid** (1,125 L/ha), **Batalion 450 SC** (0,7 – 1 L/ha) ali **Faban** (1,2 L/ha). Naštetim pripravkom, razen Fabanu, je potrebno dodati enega od naštetih kontaktni fungicid.

Uporaba sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi bi bila **smiselna samo v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja**.

V ekološki pridelavi se lahko uporabi pripravek **Curatio** – žvepleno apnena brozga, ki ima dovoljenje za nujne primere in ga smejo uporabiti samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Pri sortah, ki so občutljive na jablanovo pepelovko **v primeru temperaturah nad 15°C** dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Azumo WG**, **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulud DF**, **Microthiol specilal**, **Microthiol disperss Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol sulphur 800 SC**, **Symbiotica Fito** –tekoče žveplo ali **Vertipin**.

Jabolčni zavijač

Let prve generacije metuljčkov jabolčnega zavijača se začne, ko je vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C med 70 in 80 °C, kar po dolgoletnih opazovanjih na območju Celjske in Koroške regije sovпада s fenološko fazo intenzivnega odpadanje venčnih listov (BBCH 67). Trenutno je na sadjarskih lokacijah Celjske regije vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C od 12,1 °C (Braslovče); 18,4 °C (Ponikva); 33,8 °C (Kasaze); 35,1 °C (Črnova); 42,8 (Slovenske Konjice) do 52,8 °C (Bistrica ob Sotli). Glede na dane podatke in vremensko napoved lahko na območju Celjske regije prve metuljčke jabolčnega zavijača pričakujemo po otoplitvi vremena oz. v naslednjem tednu. V kolikor se boste pri zatiranju jabolčnega zavijača odločili za metodo zbežanja–konfuzijo, takrat izobesite feromonske vabe in ob ulovu prvih metuljčkov na feromonske vabe, izobesite tudi dispenzorje. Izberete lahko med naslednjimi dispenzorji: **RAK 3**, **ISOMATE C TT**, **Checkmate puffer CM –Pro** ali **Semios NET – Codling Moth**

Hrušev ožig

Vremenske razmere trenutno ne ustvarjajo pogojev za cvetne okužbe in razvoj bakterije *Erwinie amylovora*, povzročiteljice hruševega ožiga.

Datum objave obvestila: 20.04.2022 13:52

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

