



32. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 21.04.2022 14:04 - Zaključeno



Akarinoza (*Calepitrimerus vitis*), erinoza (*Colomerus vitis*), oidij vinske trte (*Uncinula necator*) in črna pegavost vinske trte (*Cryptosporella viticola*)

Zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) so v fenofazi D-E po Baggolini-ju oziroma v fenofazi 11-12 po BBCH lestvici. Za zatiranje **pršice trsne kodravosti** in **trsne listne pršice šiškarice** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Disperss, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Vinograde, ki so v fenofazi 11-13 po BBCH lestvici oz. je tretji list že razgnet in so okuženi s **črno pegavostjo vinske trte** je sedaj primerno škropiti z naslednjimi fungicidi:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
COSAN	2,5-6,25 kg/ha
CUPRABLAU Z 35 WG	3 kg/ha
CUPRABLAU Z 35 WP	3 kg/ha
FOLLOW 80 WG	1,9 kg/ha
FOLPAN 80 WDG	1,9 kg/ha
KUMULUS DF	2,5-6,25 kg/ha
MICROTHIOL DISPERSS	2,5-6,25 kg/ha
MICROTHIOL SPECIAL	2,5-6,25 kg/ha
MIKAL FLASH	3 kg/ha
MOMENTUM F	3 kg/ha
PEPELIN WG	2,5-6,25 kg/ha
POLYRAM DF	0,3 %; 3 kg/ha
THIOVIT JET	2,5-6,25 kg/ha
UNIVERSALIS	2 l/ha
VINDEX 80 WG	2,5-6,25 kg/ha

V ravninskih legah kjer so pozne sorte še v fenofazi BBCH03 (konec nabrekanja brsta: brsti nabrekli vendar še ne zeleni) za zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vinske trte lahko uporabite pripravek RED FOX v odmerku 25-30 l/ha.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 21.04.2022 14:04

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

