

### 35. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 21.04.2022 16:21 - Zaključeno



#### Breskova pepelovka

Nasadi breskev in nektarin so v fenofazi H po Baggioliniju oz. BBCH71 (rast plodnice; odpadanje plodičev po cvetenju). Sedaj lahko opravite preventivno zatiranje **breskove pepelovke**. Za zatiranje priporočamo uporabo sredstev na osnovi **žvepla**.

Registrirana sredstva za zatiranje breskove pepelovke na breskvah:

| Sredstvo                         | Odmerek ali koncentracija |
|----------------------------------|---------------------------|
| AZUMO WG                         | 7,5 kg/ha                 |
| BIOTIP SULFO 800 SC              | 6 l/ha                    |
| COSAN                            | 5 – 7,5 kg/ha             |
| CURATIO - ŽVEPLENO APNENA BROZGA | 6 l/ha                    |
| FYTOSAVE                         | 2 l/ha                    |
| KUMULUS DF                       | 5 – 7,5 kg/ha             |
| MAVITA 250 EC                    | 0,03 % oz. 0,45 l/ha      |
| MICROTHIOL DISPRESS              | 5 – 7,5 kg/ha             |
| MICROTHIOL SPECIAL               | 5 – 7,5 kg/ha             |
| PEPELIN                          | 5 – 7,5 kg/ha             |
| POL-SULPHUR 800 SC               | 6 l/ha                    |
| SCORE 250 EC                     | 0,03 % oz. 0,45 l/ha      |
| SERCADIS                         | 0,15 l/ha                 |
| SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO  | 6 l/ha                    |
| THIOVIT JET                      | 5 – 7,5 kg/ha             |
| VERTIPIN                         | 5 l/ha                    |
| VINDEX 80 WG                     | 5 – 7,5 kg/ha             |

**Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

#### Listne uši

V nekaterih nasadih breskev v Vipavski dolini in Slovenski Istri opažamo populacije **zelene** in **rjave breskove uši**. Škodljivce zatiramo, če je presežen prag škodljivosti.

Prag škodljivosti za posamezno vrsto listnih uši:

|                                        |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siva breskova uš                       | 3 % naseljenih brstov pred cvetenjem, oziroma 7 % napadenih poganjkov po cvetenju. Za nektarine je tudi po cvetenju prag škodljivosti 3 % |
| Zelena breskova uš                     | 10% napadenih poganjkov                                                                                                                   |
| Črna breskova uš,<br>Rjava breskova uš | 7% napadenih poganjkov                                                                                                                    |
| Medena breskova uš                     | prisotnost                                                                                                                                |

Za zatiranje listnih uši na breskvah in nektarinah so registrirani spodnji pripravki:

| Sredstvo       | Odmerek ali koncentracija                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFINTO         | 0,14 kg/ha                                                                                    |
| MOSPILAN 20 SG | 0,025 % - 0,04 %                                                                              |
| NEEMAZAL-T/S   | 1,5 l/ha (na meter višine krošnje in porabi najmanj 500 L vode na ha na meter višine krošnje) |
| PRIMOR 50 WG   | 0,075 % oz. 0,75 kg/ha                                                                        |
| TEPPEKI        | 0,14 kg/ha                                                                                    |

Za zatiranje listnih uši na breskvah je bilo pripravku Asset five izdano dovoljenje za nujne primere. Sredstvo se uporablja v odmerku 0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji.

**Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 21.04.2022 16:21

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

