



36. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 21.04.2022 16:22 - Zaključeno



Listne uši

Na izpostavljenih legah so nasadi zgodnjih sort češenj v fenofazi BBCH67 (venenje cvetov: večina venčnih listov odpadlo). Pridelovalcem svetujemo, da pozorno spremljajo populacijo **črne češnjeve uši**. Zatiranje uši opravite po končanem cvetenju, ko bodo vsi venčni listi odpadli.

Za zatiranje listnih uši na češnjah in višnjah so registrirani spodnji pripravki:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
AFINTO	0,14 kg/ha
MOVENTO SC 100	1,5 l/ha
NEEMAZAL-T/S	1,5 l/ha (na meter višine krošnje in porabi najmanj 500 L vode na ha na meter višine krošnje)
TEPPEKI	0,14 kg/ha

Za zatiranje listnih uši na češnjah je bilo pripravku Asset five izdano dovoljenje za nujne primere. Sredstvo se uporablja v odmerku 0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji.

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Mali zimski pedic

V nasadih zgodnjih sort češenj, ki so že odcvetele se že pojavljajo gosenice **malega zimskega pedica**. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite pripravke, ki so navedeni v spodnji preglednici.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
AGREE WG	1 kg/ha
EXIREL	50-60 ml/hl oz. največ 0,9 l/ha
NEEMAZAL-T/S	1,5 l/ha (na meter višine krošnje in porabi najmanj 500 L vode na ha na meter višine krošnje)

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 21.04.2022 16:22

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

