



27. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 25.04.2022 12:03 - Zaključeno



Po zaključenem cvetenju je v nasadih koščičarjev potrebno posvetiti pozornost pojavljanju sesajočih in grizočih škodljivcev.

Na češnjah se po cvetenju pojavlja **črna češnjeva uš**, ki jo je potrebno zatirati v primeru, da je prag škodljivosti presežen (prisotne kolonije na več kot 3% poganjkov). Škodljivca lahko zatirate z enim izmed insekticidov **Afinto**, **Teppeki**, **Movento SC 100**, **Asset five** ali **Neemazal T/S**. Na breskvah in nektarinah lahko za zatiranje **listnih uši** uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: **Mospilan 20 SG**, **Pirimor 50 WG**, **Afinto**, **Asset five**, **Neemazal T/S** in **Teppeki**. V nasadih sliv in češpelj, v katerih ste s spremljanjem naleta **češpljeve grizlice** ugotovili presežen prag škodljivost (30 osic na belo lepljivo ploščo) je po končanem cvetenju potrebno opraviti zatiranje škodljivca. Uporabite lahko insekticid **Mospilan 20 SG**, ki učinkuje tudi proti listnim ušem. Za zatiranje listnih uši lahko uporabite tudi pripravke **Teppeki** in **Movento SC 100**, **Asset five** in **Neemazal T/S**.

V nasadih koščičarjev po cvetenju občasno škodo povzročajo tudi gosenice **malega zimskega pedica**, ki se prehranjujejo na listih rastlin. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite sredstva **Exirel (češnje, višnje, slive)**, **Agree WG**, **Neemazal T/S**. Slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Tretiranje se opravi **po cvetenju** v času izleganja gosenic škodljivih metuljev.

Nestanovitno vreme s padavinami ustvarja ugodne pogoje za razvoj in širjenje glivičnih bolezni listja kot so **listna luknjičavost koščičarjev**, **češnjeva listna pegavost**, **breskova kodravost**, **češpljeva rdeča listna pegavost** in **češpljeva rja**. V nasadih, ki so že popolnoma odcveteli je potrebno izvajati preventivno varstvo pred naštetimi boleznimi. Škropljenje s fungicidi opravite pred padavinami.

Za varstvo višenj in češenj lahko uporabite katerega od pripravkov kot je **Delan 700 WG**, **Luna Experience**, **Signum**, **Syllit 544 SC**, **Syllit 400 S** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Za varstvo sliv in češpelj so registrirani pripravki **Delan 700 WG**, **Luna Experience**, **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC**, **Signum**, ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Za varstvo breskev in nektarin pa **Delan 700 WG**, **Luna Experience** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred aplikacijo čebelar nevarnih sredstev pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem času.

Datum objave obvestila: 25.04.2022 12:03

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

