



38. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 26.04.2022 14:46 - Zaključeno



Črna češpljeva grizlica in rumena češpljeva grizlica

V primeru, da se je med cvetenjem na bele lepljive plošče ujelo več kot 30 osic **češpljeve grizlice** je priporočljivo, da **tik po cvetenju** opravite škropljenje nasadov. Za zatiranje grizlic je registriran pripravek Mospilan 20 SG v 0,04 % koncentraciji.

Sredstvo je čebelarjem nevarno zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo pripravka pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Listne uši

V sadovnjakih, ki so odcveteli je potrebno spremljati pojav **listnih uši**. Če je napadenih več kot 5 % pogankov je priporočljivo opraviti zatiranje škodljivcev.

Registrirana sredstva za zatiranje listnih uši na slivah:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Afinto	0,14 kg/ha
Mospilan 20 SG	0,025 – 0,04 %
Neemazal-T/S	1,5 l/ha na meter višine krošnje; maksimalni odmerek 4,5 l/ha
Teppeki	0,14 kg/ha

Za zatiranje listnih uši na slivah je bilo v letošnjem letu izdano izjemno dovoljenje pripravku Asset five. Pripravek uporabite v odmerku 0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji.

Mokasto češpljevo uš lahko zatirate tudi s pripravkom Movento SC 100 katerega uporabite v odmerku 1,5 l/ha.

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 26.04.2022 14:46

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

