



### 31. VARSTVO VINSKE TRTE - 29.04.2022 08:31 - Zaključeno



Vinska trta brsti. Mladike so velike nekaj centimetrov in imajo v povprečju razvite 3 do 4 lističe (11 – 14 po lestvici BBCH).

Nestanovitno vreme omogoča ugodne pogoje za okužbo s **črno pegavostjo vinske trte**. Za varstvo vinogradov svetujemo pripravke **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **POLYRAM DF** (največji odmerek 3 kg/ha) ali **UNIVERSALIS** (2 l/ha), ki učinkuje tudi proti **oidiji vinske trte**. Do razvoja treh lističev pridejo v poštev še **pripravki na osnovi bakra** (CUPRABLAU Z 35 WG, CUPRABLAU Z 35 WP [3 kg/ha]), ki jih lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Predvidena sta dva nanosa; prvič ste tretirali, ko so bile mladike velike ~ 2 cm in drugič 7 do 10 dni kasneje.

Na predelih kjer se pojavljajo napadi **trsne pršice / erinoza**, je možno uporabiti **VERTIMEC PRO** (0,1 % koncentracija, največji dovoljeni odmerek 1 l/ha)

**Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 29.04.2022 08:31

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

