



32. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 29.04.2022 08:33 - Zaključeno



Nasadi jablan zaključujejo cvetenje (68 po lestvici BBCH).

V preteklih dneh smo zabeležili dve dodatni možni okužbi z **jablanovim škrlupom** (21.04. močna in 27.04.2022 srednje močna možna okužba) z visoko intenzivnostjo sproščanja askospor. Vstopamo v zahtevnejše obdobje za varstvo nasadov. Svetujemo uporabo preventivnih fungicidov kot so: **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha),... ki jih je potrebno nanašati v razmikih prilagojenih količini padavin in prirastu listne površine. Zaščitna obloga je oslabiljena, ko pade 20 – 25 mm dežja na m². Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi potrebo po zaščiti listne površine, ki se razvije z intenzivnejšim priraščanje listne mase v obdobju po zaključenem cvetenju. V primeru, da listne površine pred dolgotrajnejšimi padavinami ne bi mogli pravočasno zaščititi, je potrebno prej navedene pripravke kombinirati tudi s: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha) ali **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha). V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Pri občutljivih sortah na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) svetujemo sredstva: **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REVYONA** (2 l/ha). Možna je tudi raba: **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha), **TOPAZE** (0,5 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali

pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**

Pri spremljanju naleta **jabolčne grizlice** na **bele lepljive plošče** upoštevajte, da je prag škodljivosti dosežen, ko se ulovi 30 ali več osic na ploščo. Za varstvo pridelka pride po zaključenem cvetenju v poštev pripravek **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode) ali **NEEMAZAL – T/S** (4,5 l/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Njegov drugi nanos (prvič pred cvetenjem) je predviden po zaključenem cvetenju. Z navedenima pripravkoma zatirate tudi **listne uši** in **sadnega listnega duplinarja**. Lepljive plošče po koncu spremljanja odstranite, saj se lahko nanje ulovijo tudi koristni organizmi.

Uporaba insekticidnih pripravkov v času cvetenja ni predvidena; sredstva, ki so čebelam in ostalim opraševalcem nevarna pa v tem času ni dovoljeno uporabljati.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 29.04.2022 08:33

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

