



33. VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST - 29.04.2022 08:35 - Zaključeno



Nasadi breskev in češenj so zaključili s cvetenjem in razvijajo plodiče (71 – 72 po lestvici BBCH).

Pogoste padavine omogočajo okužbe z *listnimi pegavostmi* in *listno luknjičavostjo koščičarjev*. V nasadih češenj priporočamo nanos fungicidov kot so: **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha; tudi v nasadih breskev in marelic), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha; tudi v nasadih breskev), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha) ali **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; tudi v nasadih breskev in marelic).

Svetujemo, da po zaključenem cvetenju sledite tudi populacijam listnih uši in v primeru preraszmnožitve **črne češnjeve uši** (kolonije razvite na več kot 3 % poganjkov) zaščitite nasade. Ukrepate lahko s pripravki: **AFINTO** (0,14 kg/ha), **TEPPEKI** (0,14 kg/ha; češnja, višnja, marelica, breskev in nektarina), **MOVENTO SC 100** (1,5 l/ha; le češnje višnje in slive) ali **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Pripravek **ASSET FIVE** (0,96 l v 1500 l vode) ima dovoljenje za nujne primere preraszmnožitve listnih uši. V nasadih breskev je najbolj problematična **siva breskova uš** (7 % napadenih poganjkov breskev, 3 % napadenih poganjkov nektarin). Proti njej prideta v poštev še **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha) in **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 29.04.2022 08:35

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

