



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Pečkarji / 35. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

35. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 04.05.2022 16:07 - Zaključeno



Nasadi jablan so na večini leg zaključili s cvetenjem, oblikujejo se plodiči (69 – 71 po lestvici BBCH).

Po neurju, ki ga je na območju Posavja in nekaterih predelih Dolenjske spremljala toča, je obvezno obnoviti zaščitno fungicidno oblogo za varstvo pred **jablanovim škrlupom**. Možnost za močno okužbo je bila nazadnje zabeležena 01.05.2022 (v trajanju 42 ur). Svetujemo uporabo preventivnih fungicidov kot so: **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha),... Če je bila na lokaciji nasada količina padavin večja od 25 l/m² in po padavinah še niste opravili ponovnega tretiranja, je potrebno prej navedene pripravke kombinirati s sredstvi, ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravično delovanje: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAMITA 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (2,34 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha). **FABAN** (1,2 l/ha) lahko uporabite samostojno.

V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Naslednji nevarnosti za primarne okužbe sta glede na vremensko prognozo nakazani (visoke jakosti) 05.05. in izredne jakosti med 06. in 07. do 08.05.2022.

Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi potrebo po zaščiti listne površine, ki se razvije z intenzivnejšim priraščanjem listne mase v obdobju po zaključenem cvetenju.

Pri občutljivih sortah na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) svetujemo v tem obdobju **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (2 l/ha). Možna je tudi raba: **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha), **TOPAZE** (0,5 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**.

Z zaključkom cvetenja iz nasada pospravite **bele lepljive plošče** za spremljanje naleta **jabolčne grizlice**. Prag škodljivosti je dosežen, ko se ulovi 30 ali več osic na ploščo. Za varstvo pridelka pride v poštev pripravek **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode) ali **NEEMAZAL – T/S** (4,5 l/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Njegov drugi nanos (prvič pred cvetenjem) je predviden po zaključenem cvetenju. Z navedenima pripravkoma zatirate tudi **listne uši** in **sadnega listnega duplinarja**.

V nasadih z izraženim napadom **jablanove mokaste uši** je potrebno po zaključenem cvetenju ukrepati s **TEPEKKI** (0,14 kg/ha) ali **AFINTO** (0,14 kg/ha).

Proti **krvavi uši** lahko uporabite **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha) ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrast.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 04.05.2022 16:07

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

