

31. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV SOJE PRED PLEVELI - 06.05.2022 12:57 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Preglednica 3: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2022, za uporabo v posevkih soje po setvi pred vznikom soje in plevelov

Fitofarmacevsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS nekatere vrste O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba, tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi
CHANON nekatere vrste E. Š. in O. pl.	aklonifen	SC	3,0 L	Preem	ČU, VPV, manjša uporaba
CLOMATE nekatere vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L 1,0 L na WO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekatere vrste E. Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L 1,0 L na WO	Preem	ČU
PROMAN nekatere vrste Š. pl.	metobromuron	SC	2,0 - 3,0 L	Preem	ČU, VPV
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
SHARPEN PLUS E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,6 L	Preem	ČU, manjša uporaba

Legenda: SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo, F- formulacija herbicida,

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, FFS – fitofarmacevsko sredstvo.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

*za to FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!

FFS** zaloge v uporabi do...

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Preglednica 4: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2022, za uporabo v posevkih soje po vzniku soje in plevelov

--	--	--	--	--	--

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
*BASAGRAN 480 E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L	Po 11-13	60 dni, tretiranje pri temperaturah do 25 °C
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L oz 1,0 L+1,0 L močila DASH HC 4,0 L oz 2,0 L+2,0 L močila DASH HC	Po 12-19	56 dni, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
HARMONY 50 SX E. Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	2 x 7,5 g deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni	Po 10-14	manjša uporaba, SZ = ČU, SZK = 14 dni
WISH TOP nekateri vrste E. O. pl. in plazeča pimeca (<i>Elymus repens</i>)	kvizalofop-p-etil	EC	0,625 – 1,17 L	Po 12-18	ČU

Legenda: SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo, F- formulacija herbicida,

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vznik posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

***za to FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!**

FFS** zaloge v uporabi do...

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 06.05.2022 12:57

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

