



30. VARSTVO PEČKARJEV - 09.05.2022 09:59 - Zaključeno



Glede na vremensko prognozo se obdobje nestanovitnega, aprilskega vremena počasi zaključuje. Kljub temu sadjarjem svetujemo, da redno spremljajo vremenske napovedi.

Na večini opazovanih lokacij so jabolane že odcvetele in začenjajo z intenzivnim priraščanjem plodičev ter listne mase. Na novo prirasla tkiva niso zaščitena s fungicidno oblogo in so zato izpostavljena okužbam. Za uspešno varstvo pred glivičnimi boleznimi je potrebno obnavljati fungicidno oblogo na **5-7 dni**, oziroma je škropljenje potrebno prilagoditi padavinam. Fungicidna obloga velja za sprano, če je skupno padlo več kot **25 mm** padavin.

Za varstvo pred jablanovim škrlup se še vedno držite preventivnega pristopa z uporabo kontaktnih fungicidov. Uporabite lahko **Delan Pro** ali **Delan 700 WG** ali **Alcoban** ali **Polyram DF**. Za uporabo v ekoloških nasadih je na voljo pripravek **Curatio**, žvepleno-apnena brozga, ki deluje tudi na jablanovo pepelovko. V primeru dolgotrajnih padavin ali, če ste s škropljenjem zamudili in so bili hkrati izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom, uporabite enega izmed sistemičnih pripravkov (**Chorus 50 WG**, **Pyrus 400 SC**, **Scala Pyramid**, **Batalion 450 SC**, **Mythos**, **Difcor 250 EC**, **Duaxo koncentrat**, **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC**, **Revyona**). Sistemičnim sredstvom dodajte enega izmed registriranih fungicidov s kontaktnim delovanjem, razen sredstvu **Faban**, ki ima že dodan kontaktni fungicid.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko je priporočljivo škropilni brozgi dodajati sredstva na osnovi **močljivega žvepla**. V močno okuženih nasadih lahko uporabite tudi enega izmed naslednjih sredstev: **Sercadis**, **Sercadis Plus**, **Luna experience**, **Luna care**, **Stroby WG**, **Tercel**, **Zato 50 WG**, **Zato plus**, **Topas 100 EC**, **Topaze**, **Duaxo koncentrat**, **Revyona**. Uporaba fungicidnih sredstev brez izrezovanja in odstranjevanja plesnivih poganjkov iz nasada **ni dovolj učinkovita**.

V nasadih, ki so popolnoma odcveteli in je bil prag škodljivosti presežen, lahko proti grizlicam uporabite **Mospilan 20 SG** ali **Neemazal T/S**. Za varstvo pred jablanovo mokasto ušjo in nekaterimi drugimi listnimi ušmi lahko uporabite sredstva kot so **Teppeki**, **Afinto** in **NeemAzal T/S**. Slednji ima stransko delovanje tudi na krvavo uš. Za zatiranje krvave uši sta na voljo tudi pripravka **Movento SC 100** in **Pirimor 50 WG**. Za ukrepanje proti rdeči sadni pršici in drugim vrstami pršic so na voljo pripravki **Kanemite SC**, **Nissorun 10 WP** in **Zoom 11 SC**.

Večina insekticidnih sredstev je nevarnih čebelarom zato jih uporabite le v nasadih, ki so popolnoma odcveteli in imajo pokošeno cvetočo podrast. Škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte!

Datum objave obvestila: 09.05.2022 09:59

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

