



40. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 12.05.2022 15:34 - Zaključeno



V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki so večinoma večji od 10 mm (71 po lestvici BBCH).

Nedavna možnost za okužbo z zimskimi sporami **jablanovega škrlupa** je potekala od 06. do 08.05.2022. Padavine v tem obdobju niso bile intenzivne, a so neugodni pogoji trajali 45 ur, kar še vedno pomeni močno jakost okužbe. Tudi v naprej svetujemo uporabo preventivnih fungicidov kot so: **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha),... V primeru, da je zaščitna obloga fungicida izprana (količina padavin večja od 25 l/m²), bo potrebno nanos obnoviti. Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi intenzivnost prirasta nove listne površine, s čimer naj razmiki v tem obdobju ne bodo daljši od 7 dni. Če takoj po obilnejših padavinah ne uspe opraviti ponovnega tretiranja, je potrebno prej navedene pripravke kombinirati s sredstvi, ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (2,34 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha). **FABAN** (1,2 l/ha) lahko uporabite samostojno. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Pri občutljivih sortah na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) svetujemo v tem obdobju **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (2 l/ha). Možna je tudi raba: **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha), **TOPAZE** (0,5 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**.

Z zaključkom cvetenja iz nasada pospravite **bele lepljive plošče** za spremljanje naleta **jabolčne grizlice**. Prag škodljivosti je dosežen, ko se ulovi 30 ali več osic na ploščo. Za varstvo pridelka pride v poštev pripravek **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode) ali **NEEMAZAL – T/S** (4,5 l/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Njegov drugi nanos (prvič pred cvetenjem) je predviden po zaključenem cvetenju. Z navedenima pripravkoma zatirate tudi **listne uši** in **sadnega listnega duplinarja**.

V nasadih z izraženim napadom **jablanove mokaste uši** je potrebno po zaključenem cvetenju ukrepati s **TEPEKKI** (0,14 kg/ha) ali **AFINTO** (0,14 kg/ha).

Proti **krvavi uši** lahko uporabite **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha) ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

Pozorno spremljajte pojave **rdeče sadne pršice**, proti kateri boste v primeru prerazmnožitve ukrepali s: **SHIRUDO** (0,5 kg/ha), **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje) ali **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 12.05.2022 15:34

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

