



46. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 13.05.2022 15:09 - Zaključeno



Zgodnje sorte češenj (npr. Burlat) postopoma prehajajo v fenofazo zorenja plodov BBCH77-81.

Plodova vinska mušica

Pridelovalcem priporočamo, da v nasade nastavijo prehranske pasti s katerimi spremljajo populacijo **plodove vinske mušice**. Škodljivcu ustreza deževno vreme. V primeru padavin v času dozorevanja lahko plodova vinska mušica povzroči večjo škodo v nasadih.

Za spremljanje plodove vinske mušice lahko uporabimo pollitrške platenke, ki imajo na zgornjem delu luknjice s premerom od 4 do 6 mm. V platenke nalijemo 1 dl raztopine jabolčnega kisa in rdečega vina (v razmerju 3:1) kateri dodamo žličko sladkorja. V času zorenja vabe pregledujemo vsak dan in po potrebi menjamo raztopino.

Registrirana sredstva za zatiranje plodove vinske mušice na češnjah in višnjah na dan 13.5.2022 so:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
*Asset Five (4)	0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 %	7
Exirel	75 ml/hl oz. največ 1,0 l/ha	7
Imidan 50 WG	1,5 kg/ha	14

*Pripravku je bilo izdano dovoljenje za nujne primere in velja od 15.6.2022 do 14.10.2022.

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

Češnjeva muha

V nasade je priporočljivo postaviti rumene lepljive plošče s katerimi spremljamo pojav **češnjeve muhe**. Lepljive plošče obesite na južno stran krošnje. Za hektar nasada uporabite dve lepljivi plošči.

Datum objave obvestila: 13.05.2022 15:09

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

