

47. OBVESTILA O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 16.05.2022 08:32 - Zaključeno



V večjem delu Primorske so hruške in jabolane v fazi debeljenja in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 71 - 73).

Škrlup

V primeru padavin še vedno pričakujemo velike izbruhe askospor in nevarnost za okužbe s škrlupom. Priporočamo da nasade pečkarjev pred napovedanimi padavinami ponovno poškopite s kontaktnimi fungicidi ter zaščitite novo priraslo listno maso. V ta namen lahko uporabite pripravke na osnovi metiram in kaptana. V obdobju nestabilnega vremena dajemo prednost pripravkom na osnovi ditianona oz. pripravkom kot so: **Delan 700 WG**, **Alcoban** in **Delan Pro**, ki imajo daljše kurativno delovanje. V primeru večje količine padavin oz. dolgotrajne omočenosti listja, svetujemo, da takoj, ko vremenske razmere dopuščajo, opravite škropljenje s sistemičnimi pripravki kot so **Score 250 EC**, **Difcor 250 EC**, **Mavita 250 EC** ali **Difenzone** v odmerku 0,2 L/ha ter **Duaxo koncentrat** v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha ali **Domark 100 EC** v odmerku 0,4 L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Sredstvo	Aktivna snov	Odmerek, konc.
Polyram DF	metiram	2,0 kg/ha
Delan pro	ditianon	0,75 kg/ha
Alcoban	ditianon	0,75 kg/ha
Delan pro	ditianon + kalijeve fosfonati	2,5 L/ha
Captan 80 WG	kaptan	2,0 kg/ha
Merpan 80 WDG	kaptan	1,88 kg/ha
Orthocide 80 WDG	kaptan	2,0 kg/ha
Scab 80 WG	kaptan	1,9 kg/ha
Scab 480 SC	kaptan	3,13 L/ha
Merplus	kaptan + kalijeve fosfonati	2,0 L/ha
Score 250 EC	difenokonazol	0,2 L/ha
Difcor 250 EC	difenokonazol	0,2 L/ha
Mavita 250 EC	difenokonazol	0,2 L/ha
Duaxo koncentrat	difenokonazol	1,1 L na višinski meter krošnje/ha (Max. 3,3 /ha)

Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko lahko uporabite naslednje pripravke: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Luna Care v odmerku 1kg/m krošnje (maks. 3,0 kg/ha), Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 2,5 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,...) priporočamo, da škroplilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Microthiol disperss, Vertipin, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito) v odmerku 3 - 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)

V zadnjem tednu v Vipavski dolini beležimo velike ulove jabolčnega zavijača. Zaradi toplega vremena prihaja do odlaganja jajčec. V vrhu ulova metuljčkov je optimalen čas za uporabo pripravkov kot sta **Insegar 25 WG** v odmerku **0,6 kg/ha** ali **Harpun** v odmerku **1L/ha**, ki delujeta na jajčeca (ovicidno). Na toplejših območjih v Vipavski dolini, kjer je bil vrh ulova metuljčkov že dosežen, lahko v prihodnjih dneh uporabite pripravek Coragen v odmerku **0,27 L/ha** ali **Mimic** v odmerku **0,9 - 1,0 L/ha**. Na ostalih območjih na Primorskem so ulovi zavijača še pod pragom škodljivosti, zato škropljenje še ni potrebno.

Navadna hruševa bolšica (*Cacopsylla pyri*)

V nasadih opazamo veliko število odloženih jajčec hruševe bolšice ter začetek izleganja ličink. Svetujemo pregledovanje mladih poganjkov in vršičkov, kjer najdemo odložena jajčeca in izlegle ličinke (nimfe) hruševe bolšice. Škropljenje je potrebno opraviti, če na 100 pregledanih poganjkov, opazimo 15 poganjkov napadenih z mladimi ličinkami (nimfami I. in II. stadija). Pri zatiranju hruševe bolšice v tem obdobju dajemo prednost pripravkom **Movento 100 SC v odmerku 1,9 L/ha**, **Vertimec pro v odmerku 1,125 l/ha**, **Delegate 250 WG v odmerku 0,3 kg/ha** in **Harpun v odmerku 1 L/ha**. Naštetim pripravkom je zaradi boljše oprijemljivosti priporočljivo dodati sredstva na osnovi rastlinskih ali mineralnih olj v 0,25 % koncentraciji.

Za zatiranje hruševe bolšice so registrirani tudi pripravki Mospilan v 0,05 % konc., Karate zeon 5 CS v 0,018 % konc., Karis v odmerku 90 mL/ha ter Naturalis v odmerku 2L/ha.

Krvava uš (*Eriosoma lanigerum*)

Za omejevanje populacije krvave uši lahko uporabite pripravek **Pirimor 50 WG** v največjem dovoljenem odmerku **0,75 kg/ha**. Za boljši oprijem škroplilne brozge je priporočljivo dodajanje močila oz. oljnega pripravka. Uporabite lahko tudi pripravek **Movento SC 100v** odmerku **1,9 L/ha**, ki deluje tudi zoper listne uši, listne hrčice ter na izležene ličinke kaparjev. Prag škodljivosti za krvavo uš znaša 12 kolonij krvave uši na sto poganjkov oz. 5 - 8 % napadenih vej. Ukrep svetujemo samo za nasade kjer je prišlo do prerazmnožitve krvave uši oz. kjer je niste uspeli omejiti s škropljenji pred cvetenjem.

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

Hrušev ožig (*Erwinia amylovora*)

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Datum objave obvestila: 16.05.2022 08:32

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS

