



### 37. Obvestilo o vartsvo hmelja pred škodljivci - 16.05.2022 08:41 - Zaključeno



#### Hmeljev bolhač

Hmeljev bolhač je v teh dneh na posameznih lokacijah množično prisoten, še posebej v prvoletnih nasadih. Mestoma je prag škodljivosti dosežen in že presežen, zato vam svetujemo uporabo a.s. lambda-cihalotrin in sicer insekticid Karate Zeon 5 CS (uporaba v koncentraciji 0,01 %), ter Karis 10 CS (uporaba v 0,005 % koncentraciji). Pazite na vse omejitve glede odmikov od voda 1. in 2. reda, ki so navedena v preglednici 1. Sredstva ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Ker sta sredstvi nevarni za čebele, jin ne sme uporabljati v času paše čebel. Pred aplikacijo je potrebno odstraniti cvetočo podrast okrog hmeljišč. Ker gre za kontaktna sredstva, je njuno delovanje kratko, sredstva pa se ob večji količini dežja tudi izprejo. V letošnjem letu je pridobil registracijo pripravek Exirel, kot manjša uporaba, kateri ima registracijo prvenstveno za zatiranje lucerninega rilčkarja, deluje pa tudi na hmeljevega bolhača. Njegova uporaba je dovoljena od razvoja 1 do 9 parov listov. (BBCH 11-19). **Naj pa vas opozorimo, da insekticid Exirel nima znanih količin ostankov za Ameriko, Kitajsko, zato njegovo uporabo odsvetujemo, oziroma se morate pred njegovo uporabo posvetovati s svojim kupcem hmelja.**

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za varstvo hmelja v letu 2022: Hmeljev bolhač (*Psylliodes attenuatus*)

| Pripravek                                                           | Aktivna snov      | Razvrstitev po IRAC (koda) | Konc./ odmerek              | Karencia (dni)               | Maksimalno število škropljenj v rastni dobi | Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in (2. reda) v m |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                     |                   |                            |                             |                              |                                             | Šobe klasične                                                        | Šobe Agrotop TD |
| Karate Zeon 5 CS                                                    | lambda-cihalotrin | 3A                         | 0,007-0,01 % (0,25 l/ha)    | 21                           | 2-krat                                      | 40                                                                   | 20              |
| Karis 10 CS                                                         | lambda-cihalotrin | 3A                         | 0,0035-0,005 % (0,125 l/ha) | 14                           | 2-krat                                      | 50                                                                   |                 |
| Exirel*<br>(trenutno niso znane količine ostankov za ZDA, Kitajsko) | ciantraniliprol   | 28                         | 0,75 l/ha                   | zagotovljena s časom uporabe | 1-krat                                      | 15(10)                                                               |                 |

#### Hmeljeva listna uš

V letošnjem letu smo v Žalcu prvo krilato uš na hmelju našli 3. maja. V zadnjih dveh dneh smo v povprečju našli 4 uši na rastlino. V naslednjih dneh bo populacija naraščala. Zaenkrat uši v nasadih še ne povzročajo posebnosti. V naslednjih tednih bodite pozorni, če se uši v hmeljiščih, ki ležijo ob gozdnih robovih in na posamičnih kritičnih točkah ne prerazmnožijo in posledično zaustavijo rast in razvoj.

Datum objave obvestila: 16.05.2022 08:41

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Rak Cizej Magda

Pripravila: **Magda Rak Cizej**

Seznam registriranih FFS

