



33. VARSTVO PEČKARJEV - 16.05.2022 10:10 - Zaključeno



Pečkate sadne vrste so v fazi intenzivnega priraščanja listne mase in plodičev. V tem času je priporočljivo obnavljati fungicidno oblogo na **5 do 7 dni**, oziroma škropljenje prilagoditi količini padavin. Fungicidna obloga velja za sprano, če je skupno padlo več kot **25 mm** padavin.

Za varstvo pred **jablanovim škrlupom** svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov. Uporabite lahko **Delan pro** ali **Delan 700 WG** ali **Alcoban** ali **Polyram DF**. V ekoloških nasadih lahko uporabite pripravek **Curatio**, ki učinkuje tudi proti **jablanovi pepelovki**. Uporaba sistemskih, kurativnih pripravkov je upravičena le v primeru, če škropljenja niste uspeli opraviti pred dežjem, ob napovedanih več dnevni padavinah. Hkrati morajo biti pogoji za okužbe izpolnjeni. Uporabite lahko IBE pripravke: **Difcor 250 EC**, **Duaxo koncentrat**, **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC**, **Revyona** ali anilinopirimidinske: **Chorus 50 WG**, **Pyrus 400 SC**, **Scala**, **Pyramid**, **Batalion 450 SC**, **Mythos**. Sistemskim sredstvom dodajte enega izmed registriranih fungicidov s kontaktnim delovanjem, razen sredstvu **Faban**, ki ima že dodan kontaktni fungicid.

Proti **jablanovi pepelovki** uporabite sredstva na osnovi **močljivega žvepla**. V močno okuženih nasadih lahko uporabite tudi enega izmed naslednjih sredstev: **Sercadis**, **Sercadis Plus**, **Luna experience**, **Luna care**, **Stroby WG**, **Tercel**, **Zato 50 WG**, **Zato plus**, **Topas 100 EC**, **Topaze**, **Duaxo koncentrat**, **Revyona**. Uporaba fungicidnih sredstev brez izrezovanja in odstranjevanja plesnivih poganjkov iz nasada **ni dovolj učinkovita**.

Za varstvo pred **jablanovo mokasto ušjo** in nekaterimi **drugimi listnimi ušmi** lahko uporabite sredstva kot so **Teppeki**, **Afinto** in **NeemAzal T/S**. Slednji ima stransko delovanje tudi na **krvavo uš**.

Visoke temperature preteklih dni so močno spodbudile razvoj in migracije **krvavih uši**. Uši migrirajo po deblu in se selijo na enoletne poganjke, kjer že začenjajo tvoriti kolonije. Pridelovalcem svetujemo spremljanje razvoja škodljivca in ukrepanje ob preseženem pragu zatiranja. Prag je presežen, ko je napadenih 5-8 % vej oz., najdete 12 kolonij na 100 poganjkov. Za zatiranje krvave uši svetujemo v tem času rabo sredstva **Pirimor 50 WG**. Pri škropljenju uporabite veliko količino vode ter dodatek močila ali olja. Uporabite lahko tudi insekticid **Movento SC 100**, ki deluje tudi proti kaparjem. Uporaba slednjega je priporočljiva v nasadih kjer imate tudi težave z ameriškim in vejičastim kaparjem. Sredstvo deluje na izležene ličinke, ki se začno izlegati konec maja in v začetku junija.

V nasadih opažamo povečanje številčnosti ulovov metuljkov **jabolčnega zavijača**, vendar so ti zelo različni, odvisno od mikrolokacije. Na večini lokacij so bili v preteklih dneh tudi izpolnjeni pogoji za odlaganje jajčec (nad 15°C ob sončnem zahodu). Pridelovalcem svetujemo spremljanje ulovov na feromonske vabe in ukrepanje ob preseženem pragu škodljivosti (5 do 7 metuljev / past / teden) ter ob izpolnjenih pogojih za odlaganje jajčec. Svetujemo uporabo sredstev **Harpun** ali **Insegar 25 EG**, ki delujeta predvsem na odložena jajčeca in morata biti nanešena pred množičnim odlaganjem. Na toplejših lokacijah lahko uporabite tudi pripravka **Coragen** ali **Exirel**, ki delujeta tudi na že izležene ličinke. Z uporabo pripravkov na osnovi virusa granuloze lahko še nekoliko počakate.

Večina insekticidnih sredstev je nevarnih čebelarom zato jih uporabite le v nasadih, ki so popolnoma odcveteli in imajo pokošeno cvetočo podrast. Škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pri izbiri pripravkov bodite pozorni tudi na maksimalno dovoljeno število uporab.

Datum objave obvestila: 16.05.2022 10:10

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

