

48. OBVESTILO O VARSTVU KORUZE PRED PLEVELI - 17.05.2022 08:23 - Zaključeno



V Vipavski dolini in drugod po Primorski so posevki koruske v različnih fazah razvoja in imajo od 2 - 4 liste (10 do 20 cm). Dežja v preteklem vikendu skoraj ni bilo, zato vznik in rast koruske še naprej ovirajo sušne razmere. Na lažjih tleh je to še bolj opazno, saj zaloge rastlinam dostopne vode v tleh skoraj ni. Koruske so zaradi sušnih razmer v stresu in so zato občutljivejše za herbicide. Pleveli so večinoma že vzkalili.

Pri uporabi herbicidov po vzniku koruske zaradi stresnih sušnih razmer lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri korusi, zato se dosledno držite priporočenih odmerkov. V tabeli navajamo herbicide, ki jih rabimo po vzniku koruske, nekateri herbicidi tudi do 8. lista koruske. Pleveli so povsod že vzkalili, zato zatiranje plevelov opravite čimprej, saj učinkovitost zatiranja z velikostjo plevelov pada. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«. Posebej priporočamo, da preberete vsa »Opozorila«, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

Pripravi: Anka Požnel, univ.dipl.inž.agr

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV ZA UPORABO PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 20. 4. 2022

PRIPRAVEK AKTIVNA SNOV	ODMEREK /ha	DELOVANJENA, UPORABA	OPOMBE
AKRIS Dimetenamid-P- 28% + terbutilazin - 25%	3 l/ha	Po vzniku, ko ima korusa od 2 do 6 listov, pleveli pa največ 2 lista. Za enoletne ozko in širokolistne plevela.	Na isti površini se tretira največ enkrat vsako 3. leto. Datum veljavnosti do 1.9.2022
BENI Bentazon - 87%	1 kg/ha	Od faze, ko ima korusa 4 do 8 listov in plevel do največ 4 prave liste. Za širokolistne plevela.	Dobro zatira belo metliko in pasje zelišče, tudi samosevno oljno ogrščico, navadno zvezdico in breskovo dresen.
BASAGRAN 480* Bentazon - 48%	1,5 – 2 l/ha	V fazi 1 do 5 listov koruske. Po vzniku plevela. Za enoletne in nekatere večletne širokolistne plevela.	Ne deluje na slak, slabše na ambrozijo.
HERBOCID XL 2,4-D (DMA) - 60%	1,25 l/ha	Pri fazi 3.- 4. listi koruske oz. 15-20cm. Za širokolistne plevela.	Za slak, osat, za ambrozijo. Lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.
ESTERON 2,4 D 2-EHE - 90,5%	1 l/ha	Pri fazi 4 – 6 list koruske. Za širokolistne plevela, za ambrozijo.	Datum veljavnosti do 31.12.2022
MUSTANG 306 SE 2,4-D 2-EHE - 45,24% + florasulam - 0,625%	0,5 – 0,6 l/ha	Do 4 – 5 lista koruske, za širokolistne plevela, slak in osat, za ambrozijo.	Datum veljavnosti do 31.12.2022

BOTIGA Piridat - 30% + mezotrion - 9%	1 l/ha	Od 2 do 8 listov. Enoleten širokolistni plevel, navadna kostreba.	
ELUMIS * Mezotrion - 7,5% + nikosulfuron - 3%	Do 1,5 l/ha	Po vzniku od 2 do 8 listov koruze, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela. Datum veljavnosti do 31.12.2022	
OSORNO = TEMSA SC Mezotrion -10%	1,5 l/ha	Uporaba v fazi od 2. do 8 listov na korusi. Za zatiranje in enoletnega širokolistnega plevela	nav. kostrebe , njivske vijolice, ambrozije , plezajoče lakote , nav. slakovca
LAUDIS WG 30 Tembotrion - 20 %	0,25 – 0,5 kg/ha + močilo	Pri 2. do 8. listih koruze.	Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevela. V komb. s herbicidi proti travnim plevelom. Omejitve pri kolobarju!

--	--	--	--

LAUDIS Tembotrion - 4,4 %	1,15 – 2,25 l/ha	Za širokolistne in nekat. ozkolistne plevela , pri 2 – 8 listu koruze.	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom. Omejitve pri kolobarju!
LONTREL 100 * Klorpiralid -10%	1 – 1,2 l/ha	Za širokolistne plevela , ko je plevel v fazi 2-6 listov oz. je korusa v fazi 2-5 pravih listov.	Osat, pelinol. ambrozija , kamilice in slak. Omejitve pri kolobarju ! Zaloge v uporabi do: 30.4.2023
CLAP Klorpiralid - 30%	0,3 l/ha	Od faze, ko ima korusa razvita 2 do 9 listov. Za širokolistne plevela	Za zatiranje osatov, modrega glavinca, njivske pasje kamilice kamilic ter omejevanje številčnosti bodičev. Na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsake 3 leta. Omejitve pri kolobarju!
LONTREL 72SG* Klorpiralid - 72%	0,17 kg/ha	Za širokolistne plevela , ko je plevel v fazi 2-6 listov oz. je korusa v fazi 2 – 9 pravih listov.	Osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak. Omejitve pri kolobarju!
PEAK 75 WG Prosulfuron - 75% + močilo	20 g/ha	Po vzniku koruze do 7. lista koruze Širokolistni pleveli	Slak, kislice in osat , za ambrozijo. Kolobarne omejitve !
STARANE FORTE Fluroksipir - 33,3%	0,54 l/ha	V fazi 2 - 6 listov koruze. Za širokolistne plevela : plezajoča lakota, breskova dresen, njivski slak.	Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je korusa 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika. Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo. Datum veljavnosti do 31.12.2022
BANVEL 480 S * Dikamba - 48 %	0,6 l/ha	Za širokolistne (enoletne in večletne) pri fazi 2-8 listov koruze.	Dobro deluje na slak, za ambrozijo.
KALIMBA = DICASH =	0,6 l/ha	Za zatiranje širokolistnega plevela. V fazi od 2. do 8 lista koruze, najboljše od 3 - 5 listov koruze.	Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28°C. Za ambrozijo. DICASH datum veljavnosti: 31.12.2022

KAMBA 480 SL* Dikamba - 48 %			
MURAL Dikamba - 48%	0,6-0,75 l/ha	Pri fazi od 2. do 5. listov.	Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevla.
ARRAT* Dikamba - 50 % + tritosulfuron - 25%	0,2 kg/ha	Od 2-8 listov koruze. Za širokolistne plevele.	Tudi na slak, za ambrozijo . Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha.
CALLAM* Dikamba - 60% + tritosulfuron -12.5%	0,3 kg/ha + DASH 0,8 -1 l/ha	Uporaba od 3. do 6. listov koruze.	Za zatiranje eno in večletnega širokolistnega plevela.
RINIDI WG Dikamba - 55% nikosulfuron - 9,2% rimsulfuron - 2,3%	440 g/ha	Po vzniku, ko ima koruza od 4 do 8 listov	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla. Datum veljavnosti: 31.12.2022
ALISEO PLUS* Dikamba - 60,52% + nikosulfuron - 9,2% + rimsulfuron -2,3%	350 – 440 g/ha + močilo Trend 90 v 0,1%	Od 2. do 6. lista koruze.	Za enol. in večletne ozko ter širokolistne plevle. V času tretiranja mora biti listje suho, najmanj 3 ure ne sme deževati. Za ambrozijo (dikamba). Datum veljavnosti: 31.12.2022
ALISEO* Nikosulfuron - 30% + rimsulfuron - 15%	70 g/ha + močilo Trend 90	Od 2. do 8. lista koruze.	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevle. Datum veljavnosti: 31.12.2022
ARIGO Mezotrion - 36% + nikosulfuron - 12% + rimsulfuron - 3%	330 g/ha + močilo Trend 90 v 0,1%	Od 2. do 8. lista koruze.	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevle.
RIM 25 WG == RINCON 25 SG Rimsulfuron - 25%	60 g/ha + močilo 0,1%	Po vzniku, od 1. do 8. lista koruze.	Za enoletne in večletne ozkolistne ter nekatere širokolistne plevle.
RIMURON 25 WG Rimsulfuron - 25%	50 g/ha + močilo 0,2 l/ha ali deljeno: 30 g/ha + 20 g/ha + močilo 0,2 l/ha	V enkratnem odmerku, ko ima koruza 2-6 listov. Ali dve deljeni tretiranji, prvič ko ima koruza 2-4 liste in drugič 8-10 dni pozneje, do faze, ko ima koruza 6 listov.	Za enoletne in večletne ozkolistne in nekatere širokolistne plevle. Nav.kostreba, plaz. pimica, latovka, nav.zvezdica, plešec, mošnjak, olj. ogrščica; manj na ščir, metliko, pasje zelišče, dresen, kamilice
TAROT 25 WG* Rimsulfuron - 25%	40 – 60 g/ha + močilo	Od 2. do 8. lista koruze.	Za travne plevle in nekatere širokolistne, divji sirek, pimica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon.
HARMONY 50 SX Tifensulfuron -metil - 50%	22,5 g/ha + močilo	Pri fazi 2 – 8 listov koruze.	za zatiranje širokolistnih plevelov, tudi za ščir in metlike.
EQUIP	2 – 2,5 l/ha	Travni in enoletni širokolistni plevli; v	Tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pimica, za ambrozijo.

Foramsulfuron - 2,25%	Močilo je že dodano!	fazi 2.-6. listov koruze.	
MOTIVELL* = SAMSON 4 SC* = BANDERA * Nikosulfuron - 4%	1 l/ha	Za travne plevela in za nekat. enoletne širokolistne plevela 3 – 8. list koruze.	divji sirek, pirnica, kostreba, za ščir; Ne deluje na slak, slabše na ambrozijo. V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevela !
STRETCH Nikosulfuron - 4%	1 l/ha	Od 2 – 8 listov koruze.	Za širokolistne in ozkolistne plevela.
KELVIN* Zaloge v uporabi do 16.12.2022 = KELVIN OD* Nikosulfuron - 4%	1 l/ha	4 – 7. list koruze oz. ko ima plevel razvita vsaj dva prava lista.	Dobro zatira ozkolistne in širokolistne plevela , predvsem: navadno kostrebo, muhviče, kamilice, ščire, nekoliko slabše nav. pirnico, divji sirek, bresk. dresen in krvavo srakonjo.
NICOSH* = PRIMERO* Nikosulfuron - 4%	1 l/ha	Za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevela, 3 – 8. list koruze. NICOSH datum veljavnosti do 31.12.2022	
TALISMAN Nikosulfuron - 4%	1,125 l/ha	Za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevela. Od 3 – 6. listov koruze.	
KELVIN MAX Nikosulfuron - 6%	0,75 l/ha	Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela , Po vzniku od 2-8 listov koruze.	
SAMSON EXTRA 6 OD* = MILAGRO EXTRA 6 OD* = MOTIVELL EXTRA 6 OD* Nikosulfuron - 6%	0,75 l/ha	Po vzniku od 2.- 8. listov koruze, za travne plevela tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči in za nekatere enoletne širokolistne plevela. Ne uporablja se jih v sladki koruzi.	
ENTAIL* = MILAGRO 240 SC* Nikosulfuron - 24%	0,17 l/ha	Po vzniku od 2-8 listov koruze, selektivnost za koruzo je najboljša od 3- 5 lista koruze. Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela	
MILAGRO PLUS Dikamba - 22% Nikosulfuron - 5%	0,8 l/ha	Po vzniku od 2-8 listov koruze. Za zatiranje enoletnega ter večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.	

MONSOON ACTIVE Foramsulfuron 3% + tienkarbazon-metil -1%	1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel.	Mogoča deljena aplikacija. Uporaba v fazi od 2-6 list korusze.
	2 l/ha ali 1 + 1 l/ha	Divji sirek.	
CAPRENO	0,3 l/ha + močilo na	Uporaba v fazi 2-6 listov korusze. Zatira dresni, belo metliko, pasje	S sredstvom tretiramo, ko so rastline suhe.

Tembotrion - 34,5% + tienkarbazon-metil -6,8%	osnovi demetilirane repičinega olja	zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec. Enoletni ozkolistni in širokolistni plevli.	Škropimo, ko imajo trav.plevli 1.-3.liste, širokol. pa 2- 4.liste. Kolobarne omejite!
SPANDIS* Dikamba - 40% + nikosulfron -10% + prosulfron - 4%	0,4 kg/ha	Uporaba, ko sta razvita 2. – 8. listov kruise Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla za ambozijo. Kolobarne omejite! <u>Sredstvo dobro deluje (85-94,9 %):</u> pelinolistna ambrozija , navadni plotni slak , njivski osat , plezajoča lakota , mrtve koprive in vijolice; navadna kostreba , plazeča pirnica , enoletna latovka, muhviči in divji sirek ; Deluje na njivski slak	<u>Zelo dobro deluje (95-100 %):</u> barž. oslez, ščiri, navadni plešec, metlike, nav. kristavec, drobn. rogoviček, navadni oslez, kamilice, enol. golšček, ščavjelistna dresen, breskova dresen, nj. gorjušica, nj. škrbinka, nav. zvezdica, nj. mošnjak in navadni bodič; proso.
FOCUS ULTRA Cikloksidim -10%	1-4 l/ha	<u>Samo za hibride kruise odporne na cikloksidim !</u> Samo proti ozkolistnim plevelom.	Ko so enoletni ozkolistni plevli v fazi od 2 pravih listov, do konca razraščanja in večletni v fazi 3-5 pravih listov oz. veliki do 15 cm.

Pripravili: A. Poženel, KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba in J. Dariž, KGZS, KGZ Nova Gorica, Oddelek za varstvo rastlin;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 20.4.2022,MKGP,URSVHVVR

Datum objave obvestila: 17.05.2022 08:23
 Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 Objavil/a: Devetak Marko
 Pripravil: **Marko Devetak**
 Seznam registriranih FFS