

35. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V SOJI - 17.05.2022 10:25 - Zaključeno



Setev soje je v Severovzhodni Sloveniji že na večini lokacij končana. Padavine v preteklem tednu in napovedane v tem vikendu, omogočajo dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov.

Za zatiranje plevelov v soji so registrirani sledeči herbicidi;

Pripravek	Odmerek, čas uporabe	Za zatiranje:
Centium 36 CS (klomazon 36%)	0,25 L/ha	Sredstvo se uporabi neposredno po setvi oziroma najpozneje 3 dni po setvi pri porabi 200 do 400 L vode na ha
Clomate (klomazon 36%)	0,25 L/ha (2,5 mL na 100 m ²)	Pred vznikom, od razvojne faze suhega semena do faze, ko je trojnati list na drugem nodiju razvit (BBCH 00-12).
Chanon (aklonifen 60%)	3,0 L/ha	Za zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela. Sredstvo se uporablja po setvi, vendar pred vznikom gojenih rastlin. Priporočena poraba vode je 150-500 L/ha
Dual gold 960 EC (S - metaloklor 96%) Prepovedan na WOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.	- v odmerku 1,0-1,3 L/ha (10-13 ml/100 m²) (izven vodovarstvenih območij) – na vodovarstvenih območjih: • 1,0 L/ha (10 ml/100 m²).	Uporaba pred vznikom soje. Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.
Efica 960 EC (S - metaloklor 96%) Prepovedan na WOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.	v odmerku 1,0-1,3 L/ha (10-13 ml/100 m ²) (izven vodovarstvenih območij) – na vodovarstvenih območjih: • 1,0 L/ha (10 ml/100 m ²).	Uporaba pred vznikom soje. Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.
Focus ultra (cikloksidim)	2,0 L/ha enoletni	Tretiranje se opravi od

10%)	ozkolistni plevel 4,0 L/ha večletni ozkolistni plevel	razvojne faze, ko so enoletni ozkolistni plevel in samosevna žita v razvojni fazi od dveh pravih listov, do konca razraščanja (BBCH 12-29) in večletni ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh do petih pravih listov (BBCH 13- 15
Harmony 50 SX (tifensulfuron – metil 50%)	Split aplikacija 2 x 7,5 g/ha	Sredstvo se v soji uporablja v razvojni fazi od popolnoma razvitih kličnih listov do razvitega četrtega lista (BBCH 1(100) - BBCH14(104)
Proman (metobromuron 50%)	2 -3 L/ha	Je talni herbicid, ki se uporablja v soji in sončnicah za zatiranje pelinolistne ambrozije (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), dresni (<i>Polygonum spp.</i>), pasjega zelišča (<i>Solanum nigrum</i>) in ščirov (<i>Amaranthus spp.</i>)
Sharpen 33 EC (pendimetalin 33%)	3 -5 L/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevlaTretira se po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na površje (BBCH 00-09).
Sharpen plus (pendimetalin 40%)	2,5 – 4 L/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevlaTretira se po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na površje (BBCH 00-09).
Stomp aqua (pendimetalin 45,5 %)	2,6 L/ha	Tretira se v času po setvi pred vznikom gojene rastline.
Wish top (kvilazotop – p – etil 12%)	0,625 - 1,17 L/ha	Za zatiranje oziroma zmanjševanje zapeveljenosti nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevla.

Prepovedan na WO I - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih, prepoved velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na WO I.

Prepovedan na NUV - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 17.05.2022 10:25

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

