

50. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 17.05.2022 15:07 - Zaključeno



Zgodnje sorte češenj so v fenofazi zorenja plodov BBCH81.

Plodova vinska mušica

Pridelovalcem priporočamo, da v nasade nastavijo prehranske pasti s katerimi spremljajo populacijo **plodove vinske mušice**. Škodljivcu ustreza deževno vreme. V primeru padavin v času dozorevanja lahko plodova vinska mušica povzroči večjo škodo v nasadih.

Za spremljanje plodove vinske mušice lahko uporabimo pollitrške platenke, ki imajo na zgornjem delu luknjice s premerom od 4 do 6 mm. V platenke nalijemo 1 dl raztopine jabolčnega kisa in rdečega vina (v razmerju 3:1) kateri dodamo žličko sladkorja. V času zorenja vabe pregledujemo vsak dan in po potrebi menjamo raztopino.

Registrirana sredstva za zatiranje plodove vinske mušice na češnjah in višnjah:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
*Asset Five (4)	0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 %	7
Exirel	75 ml/hl oz. največ 1,0 l/ha	7
Imidan 50 WG	1,5 kg/ha	14

*Pripravku je bilo izdano dovoljenje za nujne primere in velja od 15.6.2022 do 14.10.2022.

Poleg zgoraj navedenih sredstev je za zatiranje plodove vinske mušice na češnjah in višnjah registracijo pridobil tudi pripravek Laser Plus (manjše uporabe). Pripravek se uporablja v odmerku 0,15 l/ha, pri priporočeni porabi vode 500 l vode na višinski meter krošnje na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni dobi. Karenca pripravka za češnje in višnje je 7 dni.

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

Češnjeva muha

V nasade je priporočljivo postaviti rumene lepljive plošče s katerimi spremljamo pojav **češnjeve muhe**. Lepljive plošče obesite na južno stran krošnje. Za hektar nasada uporabite dve lepljivi plošči.

Za zatiranje češnjeve muhe so registrirani naslednji pripravki:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca
EXIREL	75 ml/hL oz. največ 1 l/ha	7
IMIDAN 50 WG	1,5 kg/ha	14
MOSPILAN 20 SG	0,0375 % oz. 0,375 kg/ha	14
NATURALIS	2 l/ha	ni potrebna
DECIS TRAP ČEŠNJEVA MUHA	100 vab na ha	zagotovljena z načinom uporabe

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

Marmorirana smrdljivka

V nasadih opazamo odrasle stenice **marmorirane smrdljivke**. Pridelovalcem priporočamo, da pozorno spremljajo pojav stenic v sadovnjakih in v primeru prisotnosti ukrepajo z registriranimi kemičnimi pripravki. Za zatiranje marmorirane smrdljivke na češnjah so registrirani pripravki: Asset Five (dovoljenje za nujne primere) v odmerku 0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji (karenca: 7 dni), Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha (karenca: 7 dni) in Mospilan 20 SG v največjem dovoljenem odmerku 0,375 kg/ha (karenca: 14 dni). Za zatiranje stenice na poznih sortah češenj priporočamo uporabo slednjega, saj je registriran tudi za zatiranje češnjeve muhe.

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

Navadna sadna gniloba

V primeru padavin je v nasadih priporočljivo opraviti tudi preventivno zatiranje **navadne sadne gnilobe**. Za škropljenje proti omenjeni bolezni so registrirani naslednji pripravki:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
Anylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha	Karenca ni potrebna
Luna Experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)	7
Prolectus	400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; skupni odmerek enega škropljenja ne sme preseči 1,2 kg/ha	1
Revyona	1,8 l/ha	3
Serenade Aso	8 l/ha	Karenca ni potrebna
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha	7
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha	7
Teldor SC 500	0,5 l/ha na 1 m višine krošnje; v največjem skupnem odmerku 1,5 l/ha	3
Taegro	0,185-0,37 kg/ha, poraba vode 180-1000 L/ha (manjše uporabe)	1

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 17.05.2022 15:07
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
[Seznam registriranih FFS](#)

