51. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 19.05.2022 14:04 - Zaključeno



V Vipavski dolini je zgodnji krompir že skoraj strnil vrste, poznejši krompir pa je v fazi bujne rasti. V ostalih višjih predelih Primorske je pozni krompir komaj posajen oz. je v začetnih fazah rasti. Občasne plohe in toplo vreme v zadnjih dneh nudi ugodne pogoje za širitev krompirjeve plesni v nižinah Primorske. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krompirja. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI

V Vipavski dolini je zgodnji krompir že skoraj strnil vrste, poznejši krompir pa je v fazi bujne rasti. Potrebno je začeti z zaščito proti **krompirjevi plesni**. V ostalih višjih predelih Primorske je pozni krompir komaj posajen oz. je v začetnih fazah rasti in zaradi hladnejših noči ni še pogojev za kalitev spor krompirjeve plesni. V Vipavski dolini in Slovenski Istri so sicer tla relativno suha, vendar občasne plohe omogočajo dovolj vlage na listih krompirja, kar omogoča pogoje za razvoj in širitev okužbe s krompirjevo plesnijo. V nasadih na Goriškem smo opazili tudi že nekaj okužb s **črno listno pegavostjo krompirja** (*Alternaria solani*). Prve pege opazimo na spodnjih, starejših listih. Na zgornji listni ploskvi se pojavijo temno rjave pege (glej sliko), ki se koncentrično večajo. Za okužbo je ugodno toplo vreme (20 - 30 °C) ob višji zračni vlagi in ob izmenjevanju obdobij suhega in vlažnega vremena (plohe). Običajno se Alternaria na Primorskem pojavi prej kot okužbe s krompirjevo plesnijo. Za zaščito priporočamo uporabo pripravkov, ki delujejo na obe bolezni krompirja. Priporočam vsem, da redno spremljate posevke in jih po potrebi zaščitite. Pri izkopu zgodnjega krompirja pazite na karenco!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2022

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 13.5.2022

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
BANJO = SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE	Fluazinam 50%	**0,4 l/ha**	7 dni	NE
ENERVIN	Ametoktradin 12% + metiram 44%	**2 kg/ha**	7 dni	NE
POLYRAM DF	Metiram 70%	**2 kg/ha**	21 dni	NE
RANMAN TOP	Ciazofamid 16%	**0,5 l/ha** **Datum veljavnosti: 31.7.2022**	7 dni	NE

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 13.5.2022

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
ZIGNAL SUPER	Azoksistrobin 15% + fluazinam 37,5%	**0,5 l/ha**	7 dni	**DA**
INFINITO	Fluopikolid 6,25% + propamokarb 62,5%	**1,2 - 1,6 l/ha**	7 dni	NE

CYMBAL	Cimoksanil 45%	**0,2 – 0,25 kg/ha**	7 dni	NE
SACRON 45 DG	Cimoksanil 45%	**0,22 kg/ha** **Datum veljavnosti: 31.8.2022**	14 dni	NE
CURZATE PARTNER	Cimoksanil 60%	**0,15 kg/ha** **Datum veljavnosti: 31.8.2022**	1 dan	NE
EQUATION PRO	Cimoksanil 30% + famoksadon 22,5%	**400 g/ha** **Zaloge v uporabi do: 16.9.2022**	14 dni	NE
TANOS 50 WG	Cimoksanil 25% + famoksadon 25%	**0,7 kg/ha** **Zaloge v uporabi do: 16.9.2022**	14 dni	NE
BANJO FORTE	Dimetomorf 20% + fluazinam 20%	**1 l/ha**	7 dni	NE
ORVEGO	Ametoktradin 30% + dimetomorf 22,5%	**0,8 l/ha**	7 dni	NE
REVUS	Mandipropamid 25%	**0,6 l/ha**	3 dni	NE
REVUS TOP	Difenokonazol 25% + mandipropamid 25%	**0,6 l/ha**	3 dni	**DA**
CARIAL FLEX	Cimoksanil 18% + mandipropamid 25%	**0,6 kg/ha**	7 dni	NE
PROXANIL 450 SC	Cimoksanil 5% + propamokarb hidroklorid 40%	**2-2,5 l/ha** **Datum veljavnosti: 31.8.2022**	14 dni	NE
RIVAL DUO	Cimoksanil 5% + propamokarb hidroklorid 40%	**2,5 l/ha**	14 dni	NE
REBOOT	Cimoksanil 33% + zoksamid 33%	**0,45 kg/ha** **Datum veljavnosti: 31.8.2022**	7 dni	NE
ZORVEC ENDAVIA	Bentiavalikarb-izopropil 7% + oksatiapiprolin 3%	**0,4 L/ha**	7 dni	NE
COPFORCE EXTRA	Baker v obliki bakrovega hidroksida 30% + cimoksanil 6%	**2 kg/ha** **Datum veljavnosti: 31.8.2022**	14 dni	NE

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 13.5.2022

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA

				ALTERNARIO*
NORDOX 75 WG	Baker v obliki bakrovega oksida 75%	**1 kg/ha**	14 dni	**DA** Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WP	Baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	**3 kg/ha** **Datum veljavnosti:** **31.12.2022**	14 dni	**DA** Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WG	Baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	**2,1 kg/ha** **Datum veljavnosti:** **31.12.2022**	14 dni	**DA** Dovoljen za EKO pridelavo!
BADGE WG	Baker kot bakrov oksiklorid 24,5% + baker kot bakrov hidroksid 24,4%	**3 kg/ha** **Datum veljavnosti:** **31.12.2022**	7dni	**NE** Dovoljen za EKO pridelavo!

***Alternaria solani* - črna listna pegavost krompirja**

Pripravili: A. Poženel, KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba in J. Dariž, KGZS, KGZ Nova Gorica, Oddelek za varstvo rastlin;Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 13.5.2022,MKGP,URSVHVVR

Datum objave obvestila: 19.05.2022 14:04
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
Seznam registriranih FFS