



53. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 20.05.2022 14:47 - Zaključeno



Zgodnje sorte marelic so v fenofazi BBCH79-81. Da omejimo pojav **navadne sadne gnilobe** je priporočljivo, da škropimo s pripravki iz spodnje tabele.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
AMYLO-X	1,5 do 2,5 kg/ha	Karenca ni potrebna.
CHORUS 50 WG	0,6 kg/ha	7
KARBICURE	5 kg/ha	1
MAVITA 250 EC	0,45 l/ha; 0,03 %	7
PROLECTUS	400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1,2 kg/ha	1
REYONA	1,8 l/ha	3
SCORE 250 EC	0,45 l/ha; 0,03 %	7
SERENADE ASO	8 l/ha	Karenca ni potrebna.
SIGNUM	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek 0,75 kg/ha	7
SWITCH 62,5 WG	0,08%; odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha	14
TAEGR0	0,185-0,37 kg/ha	1

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 20.05.2022 14:47

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

