



35. VARSTVO PLODOVK PRED LISTNIMI UŠMI - 23.05.2022 12:40 - Zaključeno



Na plodovkah v zavarovanih prostorih bodite pozorni na pojave listnih uši, priporočamo redno pregledovanje in pravočasno ukrepanje. Ob prvem pojavu listnih uši (Aphididae) lahko v zavarovanih prostorih za zatiranje škodljivih žuželk uporabite sredstvo na osnovi a.s. piretrin (**Biotip floral, Flora verde**) ali a.s. azadirahthin (**Neemazal – T/S**). Za zatiranje listnih uši so v zavarovanih prostorih registrirana tudi sredstva **Afinito, Pirimor 50 WG** in **Teppeki**. Uporaba insekticida **Closer** je v zavarovanih prostorih za zatiranje uši na plodovkah dovoljena od fenološke faze, ko je razvitih devet ali več pravih listov, do fenološke faze, ko ima 70 % plodov značilno zrelostno barvo. Insekticid **Sivanto prime** je za zatiranje uši registriran na plodovkah, gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso posajene neposredno v tla (hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize). Na prostem pa lahko za zatiranje uši uporabite sredstvi **Karate Zeon 5 CS** in **Mospilan 20 SG**, največ dvakrat v rastni sezoni.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite priložena navodila. Upoštevajte registracije in opozorila za varstvo ljudi in okolja!

Datum objave obvestila: 23.05.2022 12:40

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: MAROLT Neja

Pripravila: **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

