



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Krompir

/ 47. OBVESTILO O VARSTVO KROMPIRJA PRED KOLORADSKIM HROŠČEM

47. OBVESTILO O VARSTVO KROMPIRJA PRED KOLORADSKIM HROŠČEM - 29.05.2022 12:25 - Zaključeno



V preteklem tednu smo opazili prve izležene ličinke koloradskega hrošča. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo pospešeno izleganje ličink. Zatirati je potrebno nižje razvojne stadije ličink, prag škodljivosti je presežen, ko so na več kot 20% grmov odložena jajčeca in je izleženih 10 - 15 % ličink. Letno uporabimo insekticide v krompirju dva do največ trikrat. Pomembno je, da vsakič uporabimo insekticid iz druge kemične skupine, ker hrošč hitro razvija rase odporne na insekticide.

Za zatiranje je mogoče uporabiti sledeče insekticide:

AKTIVNA SNOV		FITOFARM. SREDSTVO	ODMEREK	KARENCA
azadirachtin A	Neemazal T/S	2,5 l/ha	4 dni	
	Azatin EC	1,5 l/ha	3 dni	
acetamiprid	Mospilan 20 SG	0,1 kg/ha	14 dni	
repično olje + piretrin	Raptol koncentrat	8 l/ha	3 dni	
spinosad (spinosin A+spinosin D)	Laser 240 SC	0,2 l/ha	7 dni	
	Laser plus	0,04 l/ha	14 dni	
klorantraniliprol	Coragen	0,06 l/ha	14 dni	
	Voliam	0,06 l/ha	14 dni	
metaflumizon	Alverde	0,25l/ha	14 dni	
ciantraniliprol	Benevia	0,125 l/ha	14 dni	
piretrin	Asset five	0,38 L/ha	3 dni	

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 29.05.2022 12:25

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

